

ରାଶି ଚାଷ

CULTIVATION OF SESAME



ଶ୍ରୀ ଫକୀର କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଜି. ଅମାର୍ ଜ୍ୟୋତି ମାଝୀ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପ୍ରଦ୍ଧପାତି)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଡଃ ଫାଗୁମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର


ରା.ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୬
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର





ରାଶି ଚାଷ

CULTIVATION OF SESAME



ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ) ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)
ଇଂ. ଅମୀତ୍ ଜ୍ୟୋତି ମାଝୀ ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି) ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

ରା.ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୬

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର





ରାଶି ଚାଷ

ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ :

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ

ବିଷୟବସ୍ତୁ :

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଇଂ. ଅମୀତ୍ ଜ୍ୟୋତି ମାଝୀ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ପ୍ରକାଶକ :

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ପ୍ରକାଶ କାଳ : ୨୦୨୨-୨୩



ରାଶି ଚାଷ

ରାଶି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ତୈଳବାଜି ଫସଲ । ଏହାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି । ଏଥିରେ ଲତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହାର ତେଲକୁ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ସାବୁନ, ଅତର ଓ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପିଡ଼ିଆକୁ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ :-

ରାଶି ଏକ ଉଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଫସଲ । ଏହାର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଷିବା ରତ୍ନ ଅନୁସାରେ ଭୋଦେଇ, ମାଘା ବା ନିର୍ଲିଙ୍ଗା ରାଶି କୁହାଯାଏ । ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ୧୨୫୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ୨୫-୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଲେ ଗଜା, ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଫୁଲର ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହୋଇଥାଏ । କୁହୁଡ଼ି, କରକାପାତ ଓ ଜଳାନବେଧତା (Waterlogging) ରାଶି ଗଛର ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା :-

ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର, ଦୋରସାରୁ ବାଲିଦୋରସା ତଥା ଅମ୍ଳତା (ପି.ଏଚ୍) ୫.୫ରୁ ୮.୦ ଥିବା ମାଟିରେ ରାଶି ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଲୁଣି, କ୍ଷାରୀ, ଅମ୍ଳ, ବାଲି କିମ୍ବା ମଟାଳ ମାଟିରେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ।

କିଷମ :- ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ କେତେକ ଉନ୍ନତ କିଷମର ନାମ ଓ ଗୁଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

କିଷମର ନାମ	ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ	ତୈଳ (%)	ଅବଧି (ଦିନ)		ଅମଳ (କ୍ୟୁ/ଏକର)
			ଖରିଫ	ରବି	
ଉମା	ଇଷ୍ଟ ପିଙ୍ଗଳ	୪୨-୪୬	୭୫-୮୦	୬୫-୭୦	୩.୪
ଉଷା	ଚିକ୍ନି	୪୩-୪୬	୮୫-୯୦	୭୫-୮୦	୩.୦
କନକ	ଧୂସର	୪୬-୪୮	୮୫-୯୦	୮୦-୮୫	୨.୮
କାଳିକା	ପିଙ୍ଗଳ	୪୫-୪୮	୯୦-୯୫	୮୦-୮୫	୨.୮
ନିର୍ମଳା	ଫିକାଧଳା	୪୨-୪୪	୮୦-୮୫	୭୦-୭୫	୩.୬
ପ୍ରାଚୀ	କଳା	୪୨-୫୫	୭୫-୮୦	୭୦-୭୫	୩.୬
ବିନାୟକ	ପିଙ୍ଗଳ	୪୩-୪୬	୮୫-୯୦	୮୦-୮୫	୨.୬
ସ୍ଵାରକ	ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ	୪୮-୫୨	୭୫-୮୦	୮୦-୮୫	୩.୦



ବିହନ :-



ଛଟା ବୁଣା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତି ୪ କି.ଗ୍ରା ଏବଂ ଧାଡ଼ି ବୁଣା ପାଇଁ ୨-୩ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ । ବିହନ ବୁଣିବାର ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ସହିତ ୩ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିନ୍ କିମ୍ବା ୫ ଗ୍ରାମ ଟାଇକୋଡ଼ର୍ମା ଭିରିଡ଼ି (୧୦୦ ଗ୍ରାମ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହିତ) ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ସର୍ବଦା ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ :-

ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ତାଷ କରି ଏକ ପ୍ରତି ୨ ଟନ୍ ସଜ୍ଜା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ତାଷ ସମୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଯାଏ । ବତର ଥିବା ମାଟିରେ ବିହନକୁ ବୁଣି ମଇ ଦିଆଯାଏ । ଗଭୀର ବୁଣାର ଗଜା କମ୍ ହୁଏ । ଧାଡ଼ି ବୁଣା କଲେ ଅନ୍ତଃ ତାଷ ସୁବିଧାରେ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥି ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୪୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟା ଲଙ୍ଗଳରେ ଗାର ଟାଣି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଘୋଡ଼ାଇବା ପରେ ୧-୨ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ । ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଖିଲା ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ବୁଣାଯାଏ ।

ରତ୍ନ	ବୁଣିବା ସମୟ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ	ଫେବୃଆରୀ - ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ
ବର୍ଷା	ଜୁନ୍ ୧୫ - ଜୁଲାଇ ୧୫
ଶୀତ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର

ସାର ପ୍ରୟୋଗ :-

ରାଶି ଫଳରେ ସାର ଉପାଦାନ (କି.ଗ୍ରା./ଏକର) ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ	ଯବକ୍ଷାରଯାନ	ଫସଫରସ୍	ପୋଟାସିୟମ୍	ଜିପସମ୍
ବୁଣିବା ସମୟରେ	୮	୮	୮	
୨୦ ଦିନ ପରେ (ଖରିଫ)	୮	-	-	୧୦୦
୩୦ ଦିନ ପରେ (ରବି)	୮	-	-	୧୦୦



ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ :-

ବୁଣିବାର ୨୦ ଦିନ ପରେ କୋଡ଼ାଖୋସା କରି ଅନାବନା ଗଛ ବାଛି ଗଛକୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ୧୦ ସେ.ମି. ରଖି ଅଧିକ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଦୃଶନାଶକ ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ ୩୦% ଇ.ସି. ଓ ୪.୫ ମି.ଗ୍ରା ପ୍ରତି ଲିଟର (୧୦୦ ମି.ଲି./ଏକର) ବୁଣିବାର ୩ ଦିନ ଭିତରେ କିମ୍ବା କୁଇଜାଲଫୋସଫଥ୍ ୫% ଇସି @ ୨ ମି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଲିଟର (୪୦୦ ମି.ଗ୍ରା./ଏକର) ହିସାବରେ ବୁଣିବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ବତର ଥିବା ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ବର୍ଷାରତ୍ନରେ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ । ଶୀତ (ରବି) ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କରାଯାଉଥିବା ରାଶି ଫସଲରେ ୨-୩ ଗୋଟି ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟ ତଥା ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ଜରୁରୀ ।

ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା

- ୧) ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ :- ପତ୍ରରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପରେ ମିଶିଯାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ । ଏହି ରୋଗ ମଞ୍ଜି ଓ ଜମିରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ ।

ପରିଚାଳନା : ଅମଳ ପରେ ଜମିକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ବୁଣନ୍ତୁ । ଫସଲରେ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବଲ୍ୟୁ.ପି. (୬୦୦ ଗ୍ରାମ/ଏକର) ସ୍ତେ କରାଯାଏ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ୫୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ।

- ୨) ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ : ପତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୋଲାକାର କେନ୍ଦ୍ରାଭୂତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇ ପରେ ମିଶିଯାଇ ପତ୍ର ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଝଡ଼ିପଡ଼େ ।

ପରିଚାଳନା : ବିହନ ବିଶୋଧନ ସମୟରେ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ୧ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲ୍ୟୁମ୍ବୋମାଇସିନ୍ ମିଶାଯାଏ । ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତେପ୍ଲୁମ୍ବୋମାଇସିନ୍ (୧ ଗ୍ରାମ/୧୦ ଲିଟର) ସ୍ତେ କରାଯାଏ ।



୩) ପତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ରୋଗ : ଏହି ରୋଗରେ ଗଛ ବାଙ୍ଗରା ହୁଏ ଏବଂ ଫୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇ ବାହାରେ । ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଧିକ ମାତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ରୋଗ ମାଜକୋପ୍ଲାଜ୍ମା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ଓ ପତ୍ର ତିଆଁ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଏପରି ଫସଲରୁ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ପତ୍ର ତିଆଁ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ବରିଲ୍ ୫୦ ଡବଲ୍ୟୁ.ପି. (୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍/ଏକର) ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ।

୪) ଝାଞ୍ଜଳା ରୋଗ : ଚେର ସଢ଼ିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ତଳପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଭିତର ପଟକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଝଡ଼ିପଡ଼େ । ଗଛ ଶୁଖି ମରିଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା : ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ରାଶି ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ବୁଣାଯାଏ । ଫସଲ ଅମଳ ପରେ କିଆରୀକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖାଯାଏ ।

୫) ଆବୁ ମାଛି : ଶୁକ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ରାଶି ଫୁଲରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇବାରୁ ଫୁଲ ଆବୁ ପରି ଫୁଲିଯାଏ ଓ ସେଥିରେ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ ।

ପରିଚାଳନା : ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ଫସଲରେ ଲମ୍ବିଡ଼ାକ୍ଲେପ୍ରିଡ଼ ୨୦୦ ଏସ୍.ଏଲ୍. (୮୦୦ ମି.ଲି./ଏକର) ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ ।

୬) ପତ୍ର କଟା ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ : ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ଳ ହଳଦିଆ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୁଏ । ଶୁକ୍ଳମାନେ ଗଛ ଅଗର ୨-୩ ଗୋଟି କଅଁଳ ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ତା' ଭିତରେ ରହି ସବୁଜ ଅଂଶ କୋରି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଅଗ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଗଛ ବଢ଼େ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳ ୨-୩ ଗୋଟି ଗଛ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ । ଶୁକ୍ଳ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରେ ।

ପରିଚାଳନା : ବୁଣିବାର ୨୫ ଦିନ ପରେ ଏହି ପୋକ ଫସଲରେ ଦେଖାଗଲେ ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ (୪୦୦ ମି.ଲି./ଏକର) ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ । ଫଳ ପାକଳ ହୋଇଥିଲେ କାର୍ବରିଲ୍ ୫୦% ଡବଲ୍ୟୁ.ପି. (୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍/ଏକର) ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ । ପତ୍ର ବିନ୍ଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ । ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଚିଲୋନିସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।



୭) ଛଆଣ ମଥ : ଏହାର ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଅଧିକ ଲାଗି ପତ୍ର ଖାଇ ଗଛ ସବୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଦିଅନ୍ତି ।

ପରିଚାଳନା : ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ମରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଫସଲରେ କାର୍ବାରିଲ୍ ୫୦% ଡବଲ୍ୟୁ.ପି. (୮୦୦ ଗ୍ରାମ/ଏକର) ସ୍ତେ କରାଯାଏ ।


୮) ଡାହାଣୀ ପୋକ : ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ କଷି ଫଳରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇବାରୁ ପତ୍ର ମୋଟା ହୋଇଯାଏ । ଏହି ପୋକ ଛୋଟ ପତ୍ର ବା ଅଣ୍ଡିରା ରୋଗର ବାହକ ଅଟେ ।

ପରିଚାଳନା : ସମସ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଏକା ଥରକେ ନଦେଇ ଅଧା ମୂଳସାର ରୂପେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧ ଫୁଲ କଷି ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଏ । ଫସଲରେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୨୦୦ ଏସ୍.ଏଲ୍. (୮୦ ମି.ଲି./ଏକର) ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ।

ଅମଳ :-

ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଛୁଇଁ ପାକଳ ହେଲେ ପତ୍ର ପାଟି ଝଡ଼ିଯାଏ । ସମସ୍ତ ଫଳ ଶୁଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଶୁଖୁଥିଲେ ଫସଲ କାଟନ୍ତୁ (ଅଗ ଫଳ ଶୁଖିବା ବେଳକୁ ତଳଫଳ ପାଟି ଝଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ) । କାଟିବା ପରେ ଅମଳ ଖଳାରେ ଗଛକୁ ସିଧା ଭାବରେ ଠିଆ କରି ୭ ଦିନ ରଖିଲେ ଉପର ଫଳ ଶୁଖୁ ଆସେ ଏବଂ ଝଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ । ପରେ ୨-୩ ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ଅମଳ କରାଯାଏ । କିସମ ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨-୫ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ରାଶି ମିଳିଥାଏ । ରାଶିକୁ ଶୁଖାଇ ୮-୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳାୟତ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଶୁଷ୍କ ଓ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତାରେ ପୂରାଇ ରଖାଯାଏ । ବର୍ଷାରତ୍ନ (ଖରିଫ୍) ଅପେକ୍ଷା ଶୀତ (ରବି) ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।





ପ୍ରକାଶିତ ବର୍ଷ - ୨୦୨୨-୨୩

ରାଶି ଚାଷ

ପ୍ରକାଶକ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଗଜପତି)



ରାଣି ଚାଷ

ପ୍ରକାଶିତ ବର୍ଷ— ୨୦୨୨-୨୩

ପ୍ରକାଶକ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଗଜପତି)