

ଓୟୁଏଟି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା : ୨୦୨୩୧୨୦୦୭୩

ସଘନ ଆମ୍ବ ଋଷ ଓ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବ ବଗିଚାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର



ଲେଖକ :

ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଡଃ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ


ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ



ସନ୍ଧାନ ଆୟ ଋଷ ଓ ପୁରୁଣା ଆୟ ବଢ଼ିବାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର



: ଲେଖକ :

ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଡଃ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି

ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୬

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର





ସରକାରୀ ଆୟ ଶୁଳ୍କ ଓ ପୁରୁଣା ଆୟ ବଣିଶର ପୁରବୁଦ୍ଧି



ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ : ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ : ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଡଃ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି ପବ୍ଲିକେଶନ ନଂ : ୨୦୨୩୧୨୦୦୭୩



2023120073

ପ୍ରକାଶକ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ପ୍ରକାଶ କାଳ : ୨୦୨୩-୨୪

ସନ୍ତାନ ଆୟ ଋଷ ଓ ପୁରୁଣା ଆୟ ବଗିଚାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର

ବିଶ୍ୱର ଆୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ ଆୟ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୪.୭ ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଆୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ୮୫୯୦ ହେକ୍ଟର ବଗିଚାରେ ଆୟ ଋଷ କରାଯାଏ । ତା' ମଧ୍ୟରୁ ୭୯୪୦ ହେକ୍ଟର ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଆଦାୟ କରାଯାଏ । ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବମୋଟ ଆୟ ଉତ୍ପାଦନ ୨୧, ୩୫୮ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିକତା ହାର ୩ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ।

ଆୟକୁ ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କୁହାଯାଏ । ଆୟ କଷ୍ଟା ହେଉ ବା ପାଟିଲା ସବୁରି ଆଦର । ଗଛରେ ଆୟ ଦେଖିଲେ ମନ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହତ ତା'କୁ ଡୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ଆୟର ଶସ ଠାରୁ କୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଂଶ ଦରକାରରେ ଆସେ । ପାଟିଲା ଆୟ 'ଭିଟାମିନ୍-କ' ରେ ଭରପୁର ଏବଂ 'ଭିଟାମିନ୍-କ'ର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶର୍କରା ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ଥାଏ । ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃଦ୍ୟୁସୂକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯଥା- ଆୟ ଆରୁ, ଜୁସ, ସ୍କାସ, ଆୟସଡ଼ା, ଆୟ ପାମଡ଼, ଆମରୁର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ।

ଆୟରେ କମ୍ ଉତ୍ପାଦିକତାର କାରଣ :

(କ) ଦେଶୀ ଆୟ ବଗିଚା :

ଦର୍ଭମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଆୟବଗିଚା ଅଛି, ଯାହା ଦେଶୀ ଆୟ ଟାକୁଆରୁ ହୋଇଛି । କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ ବିନା ଏହି ସବୁ ଗଛରେ ଫଳ ଧାରଣ କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଫଳର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଅଧିକତ୍ରୁ ଏହି ସବୁ ବଗିଚାରେ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ।



(ଖ) ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ ଭିତ୍ତିକ ଆୟ କିସମ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା:

ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କିସମ ଗଣନା କରାଯାଏ । ବହୁତ କିସମଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଯଥା- ଆଲଫାନ୍ସୋ, ଦଶେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଗ) ଫଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ :

ବୈବସାୟିକ ଫଳ ଧାରଣ ପାଇଁ, ଆୟ ଅଧିକ (ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ) ସମୟ ନିଏ । ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଆୟ ବଗିଚାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କଲମି ଗଛ ଦ୍ଵାରା କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ।

(ଘ) ଅନିୟମିତ ଫଳ ଧାରଣ :

କିଛି ଆୟ କିସମଗୁଡ଼ିକ ଯଥା- ନିଲମ୍ବ, ବାଙ୍ଗାଲୋରା, ରୁମାଣି, ବାଲଗଣପଲେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ଆୟ କିସମଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଧାରଣ ନିୟମିତ ନୁହେଁ । ଯଥା- ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଫଳ ଆସିଲେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଫଳ କମ୍ ଆସେ ।

(ଙ) ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଜୀୟ ବୃଦ୍ଧି :

ଚିରହରିତ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଯଥା- ଆୟ, ବର୍ଷସାରା ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଅଜୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅଜୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

(ଚ) ଭୁଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋପଣ :

ଆଗକାଳରେ ପଡ଼ିତ ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆୟ ଗଛ ଲଗା ହେଉଥିଲା । ଏହି ଆୟଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତ୍ଵ ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇନଥିଲା, ଫଳରେ ଏକର ପ୍ରତି ଗଛସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ରହୁନଥିଲା । ଫଳରେ ଏକର ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦିକତା କମ୍ ହେଉଥିଲା ।



(ହ) ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ଓ ଯୋଜ ପ୍ରଭାବ :

ସାଧାରଣତଃ ରୋଗ, ଯୋଜ ଦ୍ଵାରା ଆୟୁରେ ଅମଳ ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମଳ ୪୦ ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜ ଯଥା ଆୟୁ ତାହାଣୀ, ଫଳମାଛି ଏବଂ ରୋଗ ଯଥା- ପାଉଁଶିଆ, ଆନ୍ତ୍ରାକ୍ମୋହ ଆୟୁର ଅମଳ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

(ଜ) ଆୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ବିକାର :

ଆୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ବିକାର (Physiological Disorders) ଯଥା- ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଚିପ୍ପୁ, ଫୁଲ ବିକାର ଅଗ୍ର କଳାଦାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୁର ବଜାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମିଯାଏ ।

ଅମଳ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପାୟ :

ଉପରୋକ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଆୟୁରେ ରଖି, ଆୟୁର ଉପାଦିକତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ-

(କ) ଉପଯୁକ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ

(ସଂସ୍କୃତ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଅତି ସଂସ୍କୃତ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା)

(ଖ) ବୃକ୍ଷା ଜଳସେଚନ ଏବଂ ସାର ପରିଚ୍ଛେଦନ

(ଗ) ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ

(ଘ) ଅଧିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ

(ଙ) ଅମଳ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ

(ଚ) ନବୀକରଣ

(ଛ) ଫୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ ପ୍ରୟୋଗ



ସଂଘର ଆମ ଗୁଣ :

ଏହା ଏକ ଗୁଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଏକର ପ୍ରତି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ପାରମ୍ପରିକ ଗୁଣ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥାଏ, ଫଳରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଫଳଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଦରକାରୀ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜମିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଗଛର କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ, ଘାସବହା ଏବଂ ସିଞ୍ଚନ ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧାରେ କରାଯାଇପାରେ । ଫଳର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଫଳ ଅମଳ ମିଳେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ୫ଟି ଉପାୟରେ ସଂଘର ଗୁଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

- (କ) ବାଙ୍ଗରା କିସମ ଗଛର ଡାଳ କଲମୀ ପାଇଁ ନେବା
- (ଖ) ବାଙ୍ଗରା କିସମ ଗଛର ଟାକୁଆକୁ ମୂଳଦଣ୍ଡ କଲମୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା
- (ଗ) ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ
- (ଘ) ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ରାସାୟନିକର ବ୍ୟବହାର
- (ଙ) ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳବଗିଚା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି

ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସଂଘର ଗୁଣ ପଦ୍ଧତି ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ କଦଳୀ, ସପୁରୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଏବେ ଆମ୍ବ, ପିଙ୍କୁଳି, ଲେମ୍ବୁରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଅମଳକୁ ଦୁଇ-ତିନି ଗୁଣ ବଢ଼ାଯାଇପାରିଛି ।

ଅସୁବିଧା :

- (କ) ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।
- (ଖ) ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିମାଣର ବାଙ୍ଗରା କିସମ ଆମ୍ବଗଛର ଅଭାବ ।
- (ଗ) ଗଛମାନଙ୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଅଭାବ ।



କିନ୍ତୁ ଫଳରାଶିର ଉତ୍ପାଦିକତା ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ, ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଏକ ମାତ୍ର ବିକଳ ମାଧ୍ୟମ ।

ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି, ମଧ୍ୟମ ସରକାର ଏବଂ ଅତି ସରକାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଭେଦ ।

	ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି	ମଧ୍ୟମ ସରକାର	ଅତି ସରକାର
(କ) ବୈଦିକ ଫଳ ଧାରଣ ପାଇଁ ବୟସସୀମା	୭ ରୁ ୯ ବର୍ଷ	୪ ରୁ ୫	୩ ରୁ ୪
(ଖ) ଅମଳ କ୍ଷମତା	ମଧ୍ୟମ	ଅଧିକ	ଅତି ଅଧିକ
(ଗ) କାଷ୍ଠାଞ୍ଚ	ବହୁତ କଷ୍ଟ	ମଧ୍ୟମ	ସହଜ
(ଘ) ସିଞ୍ଚନକାର୍ଯ୍ୟ	କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ	ମଧ୍ୟମ	ଅଧିକ
(ଙ) ସିଞ୍ଚନ ଦକ୍ଷତା	ବହୁତ କମ୍	ମଧ୍ୟମ	ଅଧିକ
(ଚ) ଅମଳବହୁତ	କଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ	ବହୁତ	ସହଜ
(ଛ) ଫଳର ଗୁଣବତ୍ତା	ବଜାୟ ରଖିବା	ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ	ସମ୍ଭବ ସୁବିଧା
(ଜ) ଆନୁମାନିକ ଅମଳ (ମେଟ୍ରିକ୍‌ଟନ) ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କମ୍ ଅମଳକ୍ଷମ	୧୦-୧୨ ୫-୬	୧୮-୨୦ ୮-୧୦	୨୦-୨୫ ୧୨-୨୫
(ଝ) ବୈଦିକ ଫଳ ବର୍ଷର ବର୍ଷ	୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୩୦-୩୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	୨୦-୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ



ସଂସଦ ଋଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ :

(କ) ଗାତ ଆକାର : ୧ମି.×୧ମି.×୧ମି. (ଦୈର୍ଘ୍ୟ : ପ୍ରସ୍ଥ : ଗଭୀର)

(ଖ) ଦୂରତ୍ବ : ୮ମି.×୫ମି. (୨୫୦ ଗଛ/ହେକ୍ଟର)

୫ମି.×୫ମି. (୪୦୦ ଗଛ/ହେକ୍ଟର)

୨.୫ମି.×୩.୦ମି. (୧୩୩୩ ଗଛ/ହେକ୍ଟର)

୨.୫ମି.×୨.୫ମି. (୧୬୦୦ ଗଛ/ହେକ୍ଟର)

ସାର ପରିଚାଳନା :

ଗାତ ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୭୫ ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ୍ ୭୫ ଗ୍ରା. ।

ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପରିମାଣ ଗଛର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ାଯାଏ ।
ଯଥା- ଦୁଇବର୍ଷ ଗଛ ପ୍ରତି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ୨୦୦ ଗ୍ରା., ଫସଫରସ୍ ୧୫୦ ଗ୍ରା. ଏବଂ ପଟାସ୍ ୧୫୦ ଗ୍ରା. ।

ପୁରା ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ୍‌କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରକୁ ସମାନ ଦୁଇଭାଗରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଫଳ ଅମଳ ପରେ ଦିଆଯାଏ ।
ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଯୁରିଆ ସାରକୁ ଶତକଡ଼ା ୧ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରିବ (ହେକ୍ଟରକୁ ୫ କି.ଗ୍ରା.) ।

ଜଳସେଚନ :

ସଂସଦ ଋଷ ପଦ୍ଧତିରେ ନିୟମିତ ଫଳ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଲ୍ଲେବୁଟ୍ରାଜୋଲ୍ (ଗଛ ପ୍ରତି ୫୦ ଗ୍ରାମ) ଦିଆଯାଏ । ଏହି ରାସାୟନିକ ଦିଆଯିବା ପରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ।

ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଗଛରେ ବଉଳ ଆସିବା ଠାରୁ ଫଳ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପ୍ରତି ୧୫ରୁ ୨୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ।



କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :

- (କ) ଗଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ।
- (ଖ) ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗଛ ମୂଳରୁ ୬୦-୭୦ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତାରେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଗଛକୁ ଅଗରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ।
- (ଗ) କଟା ସରିଲା ପରେ କଟା ଜାଗାରେ ବୋର୍ଡ଼ିଂକୁ ଦ୍ରବଣର ଏକ ପ୍ରଲେପ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ।
- (ଘ) ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଚ୍ଚ- ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ (ବସନ୍ତ ଋତୁରେ) ଏହି ଅଗକଟା ଗଛରୁ ନୂଆ ଶାଖାମାନ ବାହାରେ ।
- (ଙ) ମେ' ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ । ଫଳରେ କେବଳ ଝରୋଟି ଝରି ଦିଗକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ଶକ୍ତ ତାଳ ରଖାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶାଖା କୁହାଯାଏ ।
- (ଚ) ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି ସହିତ କମ୍ କୋଣ କରି ବାହାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଝୋଟ ସୁତୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଅଧିକ ନୁଆଇଁ ଯାଇପାରିବ । ଫଳରେ ଗଛରେ ଫଳ ଧାରଣର ଆକାର ବଢ଼ିଯିବ ।
- (ଛ) ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ । ଫଳରେ ତା'ପର ବର୍ଷ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାଖା ବାହାରେ ।
- (ଜ) ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ, ଯଦି ଗଛରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାଳ ନଥାଏ, ତା'ହେଲେ ଆଉଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଥରେ ତାଳ କଟାଯାଇପାରିବ ।
- (ଝ) ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳରେ ଗଛର ମଧ୍ୟଭାଗ ଖୋଲା ରହେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧିଗକୁ ତାଳ ମାଡ଼ି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଛ ମିଳେ ।



- (ଝ) ଡାକ୍ତର କଟାକ୍ଷର ପରେ ଗଛରେ ୧ ଶତକଡ଼ା ଯୁରିଆ ଏବଂ ୦.୨ ଶତକଡ଼ା ବ୍ଲାଇଟକ୍ସ-୫୦ ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଅନ୍ତଃକାର୍ଯ୍ୟ :

ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବଗିଚାକୁ ଅନ୍ତଃରକ୍ଷା କରି ଘାସ ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ବଗିଚା ମାଟିରେ ସାର ଏବଂ ସଢ଼ା ପତ୍ର ମିଶାଯାଏ ।

ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦମନ :

ପୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ, ଫଳମାଛି ଏବଂ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଁଗିଆ ରୋଗ, ଆକ୍ରାନ୍ତନୋକ୍ ଆମ୍ବ ଗଛର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ।

- (କ) ଜାନୁୟାରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ- ନୂଆକୁନ୍ ଦ୍ରବଣ ଲିଟର ପ୍ରତି ୧.୨୫ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ।
- (ଖ) ଫେବୃୟାରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ - ନୂଆକୁନ୍ ଦ୍ରବଣ ଲିଟର ପ୍ରତି ୧.୨୫ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ।
- (ଗ) ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ - ୧୫ ମି.ଲି. ନୂଆକୁନ୍ ଏବଂ ୬ ମି.ଲି. କାରାଥେନ୍ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ।
- (ଘ) ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ - କାର୍ବାରିଲ୍ (୫%) ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାଇଟକ୍ସ-୫୦ ର ୨ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ।
- (ଙ) ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଫଳ ଅମଳ ସରିବା ପରେ ବ୍ଲାଇଟକ୍ସ-୫୦ ଦ୍ରବଣର ୦.୨ ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ୧ ପ୍ରତିଶତ ଯୁରିଆ ଗଛରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- (ଚ) ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରୋଗର ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ମି.ଲି. ଏବଂ ନୂଆକୁନ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ମି.ଲି. ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ।



- (ଛ) ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗଛ ଫୁଲରେ ପୋଲିକଲ୍ ଡିସେମ୍ବର ଗୁଣ ହେବାର ପ୍ରତି ୬ କି.ଗ୍ରା. ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ।

ଗୋବିନ୍ଦବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟ କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ସାହାରାମ ଦାଶ ୨୦ ବର୍ଷ (୧୯୭୬-୧୯୯୬) ଅନିରନ୍ତର ଆମ ବିଷୟ ବଶେରୀ ଉପରେ ସଫଳ ପଦ୍ଧତିରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୩୧୩ ଗଛ ଲଗା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୩୮ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆମ୍ଳ ଅମଳ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ଯାହା ସାଧାରଣ ଘନତା ୧୬୯ ଗଛ/ହେକ୍ଟର ଠାରୁ ୧୧.୩୮ ଗୁଣ ଅଧିକ ।

ପୁରୁଣା ବଗିଚାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର :

ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ଳ ବଗିଚା ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଯତ୍ନାବଳୀ ବହୁତ ତେଜା ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ସେସବୁ ଗଛରୁ ବହୁତ କମ୍ ଫଳ ମିଳେ ଏବଂ ଫଳ ଚୋଳିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ତେଣୁ ସେସବୁ ବଗିଚାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଫଳଧାରଣ ସମୟକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରନ୍ତା । ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେତେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ।

- * ଗଛର ଫଳଧାରଣ ଅନୁସାରେ ରୁଗ୍‌ଣ ବଗିଚା ଚୟନ ।
- * ଯେଉଁ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ।
- * ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେହି ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମି ପତନଠାରୁ ୨.୦-୨.୫ମି. ଉଚ୍ଚତାରେ କଟାଯାଏ ।
- * ଡାଳ କାଟିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ରହିବା ଉଚିତ୍, ପ୍ରଥମେ କଟା ଡାଳର ତଳପଟରୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପରେ ଉପର ପଟରୁ କଟା ହେବା ଉଚିତ୍ । ଫଳରେ ଡାଳ ଯେପରି ନପାଟେ ।



- * କଟାଗୁଡ଼ିକ ତାମ୍ବା ଏବଂ 'V' ଆକାରର ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- * ପ୍ରତି କଟା ସ୍ଥାନରେ ବୋର୍ଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବଣର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
- * ତାଳ କଟା ସରିବା ପରେ କଟା ତାଳଗୁଡ଼ିକୁ ବଗିଚାରୁ ଖୋଲି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଫଳରେ ଖତ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ।
- * ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ଗଛରେ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ।
- * ଗଛ ପ୍ରତି ୨.୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ, ୩ କି.ଗ୍ରା. ସୁପର ଏବଂ ୧.୫ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ଏବଂ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ୧୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଗଛ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଅଥା ଯୁରିଆ, ପୁରା ସୁପର ଏବଂ ପୁରା ପଟାସ୍ ଫେବୃୟାରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗ ଯୁରିଆକୁ ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଛର ଝରିପାଖରେ ୧.୫ମି. ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଏକ ନାଳୀ ଖୋଳାଯାଏ । ଏହି ନାଳୀର ମୋଟେଇ ୧ ଫୁଟ ଏବଂ ଗଭୀର ୧ ଫୁଟ ଅଟେ ।

ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ ।

କଥାରେ ଅଛି :-

“କୋଡ଼ିଏ ହାତ କରି ଫାଙ୍କ
ଆମ୍ଭ ଗଛ ପୋତି ଦେଖ ।
ଗଛ କୁ ଗଛ ଯେବେ ଲାଗଇ
ତେବେ ଫଳ ଲଭିବ ନାହିଁ ॥”



2023120073



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
email : kvk.gajapati@ouat.ac.in

