

ମକା ଫସଲରେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚ୍ଛଳନା

ସଂପାଦନା:

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ଲେଖକ:

ଡଃ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)



ବିଷୟବସ୍ତୁ:

ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଶ୍ରୀ ଜାନୁଆରିୟା କୁଜୁର

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଜାତୀନିୟମିତ)

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୨

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ମକା ଫସଲରେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚ୍ଛଳନା



ସଂପାଦନା:

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ଲେଖକ:

ଡଃ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ବିଷୟବସ୍ତୁ:

ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଶ୍ରୀ ଜାନୁଆରିୟସ୍ କୁକୁର

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ)

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୬

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର





ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ : ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ଲେଖକ : ଡଃ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ବିଷୟବସ୍ତୁ : ଡଃ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)
ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)
ଶ୍ରୀ ଜାନୁଆରିୟସ୍ କୁଜୁର
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ)

ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି ପବ୍ଲିକେଶନ ନଂ : ୨୦୨୪୧୨୦୩୯୪



2024120394

ପ୍ରକାଶକ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ପ୍ରକାଶ କାଳ : ୨୦୨୪-୨୫



ମକା ଫସଲରେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗଯୋକ ପରିଚ୍ଛେଦନା

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା, ରା ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ବହୁଳ ଭାବେ ମକା ଗଷ୍ପ କରାଯାଇଥାଏ । ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମକା ଗଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୪୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦକତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ ।

ଗୋଖାଦ୍ୟ, କୁକୁଡ଼ାଖାଦ୍ୟ, ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ତଥା କର୍ଷ୍ଟଫ୍ଲେକ୍ସ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷର କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ମକା ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଓ ଯୋକ ମକା ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହାର ଅମଳ ହ୍ରାସ ଘଟାଇଥାନ୍ତି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ୧୩.୨ ପ୍ରତିଶତ, ଯୋକ ୧୪.୩ ପ୍ରତିଶତ, ଘାସ ୯ ପ୍ରତିଶତ, ପକ୍ଷୀ ୭ ପ୍ରତିଶତ ଓ ମୂଷା ୫ ପ୍ରତିଶତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋଗଯୋକ ପରିଚ୍ଛେଦନା କରିଲେ ଏ କ୍ଷତିକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ ।

ମକା ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ :

(୧) ପତ୍ରଯୋଡ଼ା ରୋଗ :

ସବୁ ମକାଗଷ୍ପ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ଉପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଆକୃତିର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏହା ବଢ଼ିଥାଏ । ଦୁଇ ପାଖରେ ଥିବା ଶିରା ଯୋଗୁଁ ଦାଗ ଚଉଡ଼ାରେ ନ ବଢ଼ି ଲମ୍ବରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଶେଷରେ ଆୟତାକାର ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକର ଧାର ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଝିଅଂଶ ନାଲି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର । ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ପତ୍ରାଛାଦ, କାଣ୍ଡ ଓ ମକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଅଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଉଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ (୨୦-୨୫°ସେ.) ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ।



(୨) ନିମ୍ନମୁଖୀ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ :

ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଉପର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ହୁଏ ବା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଅଁର ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୋଛାଳିଆ ଦେଖାଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହୁଏ ଓ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ ।

(୩) କାଣ୍ଡସଜ୍ଜା ରୋଗ :

ଏହା ଏକ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ସଜ୍ଜା ରୋଗ । ଅଳ୍ପ ବୟସର ଗଛ ଓ ପୁରୁଣା ଗଛ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାଟି ଉପରୁ ଚଅଁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ପାଣି ପୋତକାଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ତଳ ଗଣ୍ଡିରେ ପରୁଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ତା'ପରେ ଉପର ଓ ତଳକୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଯାଏ । ପରୁ ଅଂଶରୁ ଏକ ମୃଦୁ ପରୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଏବଂ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ।

ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା (୩୦° ସେ. ରୁ ଅଧିକ) ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ କଲେ ବା ପାଣି ଜମୁଥିବା ଜମିରେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ହୁଏ ।

(୪) ବାଦାମୀ ଦାଗ :

ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରଛାଦ ଏବଂ କାଣ୍ଡରେ ଏକ ଛୋଟ ପାଣି ପୋତକା ତିମ୍ବାକୃତି ବା ଗୋଲାକାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଶେଷରେ ବାଦାମୀ ଓ ନାଲି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଓ ଏହାର ଧାର ଫିକା ରହେ । କେତେକ ଦାଗ ଏକାଠି ମିଶିଯାଇ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ବଡ଼ ଦାଗରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି । ମଝିଶିରା ଓ ପତ୍ରଛାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦାଗ ପତ୍ରଫଳକର ଦାଗ ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଓ କାଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ।

(୫) ସାଆରା (ସ୍ପର) ରୋଗ :

ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ଗଛର ସବୁ ଅଂଶରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ମକାରେ ବହୁଥିବା ଅଗ, ଚଅଁର, କାହାଳୀ, କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । କାହାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ, ସବୁଜିଆରୁ ରୂପେଳୀ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାହାଳୀର ଭିତର ଅଂଶ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ । ପତ୍ରରେ କାହାଳୀ ହେଲେ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର, କଠିନ ଓ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ,



କିନ୍ତୁ ଫାଟି ନ ଥାଏ । କାଣ୍ଡର ତଳ ଅଂଶରେ କାହାଳୀ ହେଲେ ମକା ଫଳି ନ ଥାଏ ବା ଛୋଟ ମକା ହୋଇଥାଏ । ଅଳ୍ପ ବୟସର ଗଛରେ କାହାଳୀ ହେଲେ ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହୁଏ କିମ୍ବା ଗଛ ମରିଯାଏ ।

(୬) କଳଙ୍କି ରୋଗ :

ପତ୍ରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଛୋଟ, ନାଲିଆ, ବାଦାମୀ ଗୋଲାକାରରୁ ଲମ୍ବାଳିଆ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ଗୁରୁପତେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ବେଢ଼ି ରହିଥାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଗଛ ମରିଯାଏ ।

(୭) ଝାଉଁଳା ରୋଗ :

ଗଛ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିରେ ଅଧିକ ଜଳାୟାଣ ଥିଲେ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ । ଛୋଟ ମକା ଗଛର ମାଟି ଉପରେ ଥିବା କାଣ୍ଡ ଓ ପତ୍ର ଉପରେ ପାଣିପୋତକା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । କନ୍ଦାରୁ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ । ରୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କାଣ୍ଡ ପତଳା ହୋଇ ଧାରେ ଧାରେ ମରିଯାଏ । ମକାରୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଓ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥାଏ ।

ମକା ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୋକ :

(୧) କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ :

ସଦ୍ୟଜାତ ଶୁକ ପତ୍ରର ସବୁଜକଣା କୋରି ଖାଇଥାଏ ଓ ତା'ପରେ ପତ୍ରଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାଣ୍ଡକୁ କଣା କରିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ମଝି ପତ୍ରଟି ଶୁଖି ମରିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଧରି ଭିଡ଼ିଲେ ବାହାରି ଆସେ । ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମକା ପତ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଟିକି ଟିକି ଗୁଲିବିକ୍ଷ କଣାମାନ ଦେଖାଯାଏ । କାଣ୍ଡକୁ ଚିରିଦେଲେ ଶୁକ କରିଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

(୨) ଭଣ୍ଡାଖୁଆ ପୋକ :

ମକା ଫଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋକର ଶୁକ ମକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତା' ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିରୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଯାଏ । ତେଣୁ ଉପରୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମକାରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ଅମଳ ହୁଏ ନାହିଁ ।

(୩) ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ ଓର୍ମ :

ଏହି ପୋକର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଓଲଟା ଇଂରାଜୀ Y ଭଳି ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ମକା ଗଜା ହେବାର ୧୦-୧୨ ଦିନ ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି



କୀଟର ଶୁକ୍ଳ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ଶୁକ୍ଳ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରରେ ଧଳା କୋରିଣ୍ଡା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ପରେ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ କଣା ହୋଇଯାଏ । ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ଶୁକ୍ଳମାନେ ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ଓ ମକାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ।

(୪) ଜଉପୋକ :

ଜଉପୋକ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ପାକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କମ୍ ଦିନର ଗଛ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଚର୍ମର ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମକା ହୁଏ ନାହିଁ ।

(୫) ଉଇ :

ଉଇ ମକା ଗଛର ମୁଖ୍ୟ ଚେର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱଚେରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କାଣ୍ଡରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପବନରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଏ ।

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚ୍ଛେଦନାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି :

ରୂପ ପଦ୍ଧତି :

- (କ) ଫସଲର ଅବଶେଷ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗଭୀର ଖରାଟିଆ ହଳ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଥିବା ପୋକ ଓ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
- (ଖ) ଅଣ ପୋଷକ ଫସଲ ନେଇ ଉତ୍ତମ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
- (ଗ) ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୨-୩ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- (ଘ) ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଶି କିମ୍ବା ସୋରିଷ କିମ୍ବା କଲିକତି ଗେଣ୍ଡୁରୂପ କରନ୍ତୁ ।
- (ଙ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ରୋଗପୋକର ସହନଶୀଳ ବା ପ୍ରତିରୋଧୀ କିସମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- (ଚ) ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଣାବୁଣି ସାରିଲେ ଅଧିକ ଘାସ ହୁଏ ନାହିଁ ।



(ଛ) ସୁସମ ସାର ଓ ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ରୋଗ ଯୋକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି :

- (କ) ଫସଲର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶ ଓ ଅଣ୍ଡା ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- (ଖ) ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରା, ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରା ବା ଫେରୋମୋନ୍ ଯନ୍ତ୍ରା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଯୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋକକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ । ମୁଷା ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- (ଗ) ବିହନ ବୁଣିବାର ୨-୩ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଓ ୬ ସପ୍ତାହରେ ଆଉଥରେ ଏପରି ଦୁଇଥର ହାତରେ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ।
- (ଘ) ମକା ଖାଉଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଥିବା ଫିଡା ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ ।

ଜୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି :

(କ) ସଂରକ୍ଷଣ : କ୍ଷେତରେ ତିମ୍ବ ପରଜୀବୀ ଟ୍ରାଙ୍କକୋଗ୍ରାମା ପ୍ରଜାତି, ଶୁକ୍ଳ ପରଜୀବୀ କଟେସିଆ, ବ୍ରାକନ, ଏରିଓବସ୍ ଓ ଶିକାରୀ ଯୋକ ଯଥା-ଇୟୁଗୋପା ଭୂଙ୍ଗ, କାରାବିଡ୍ ଭୂଙ୍ଗ, ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଲେସ୍ ଉଇଙ୍ଗ ଆଦି ଯୋକ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

(ଖ) ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି : ମୃତ୍ତିକା ଜନିତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜିରେ ୪ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଟ୍ରାଙ୍କକୋଡ଼ର୍ମା ଭିରିଡ଼ି ଗୋଳାଇ ଜୈବିକ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଯୋକର ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଟ୍ରାଙ୍କକୋଗ୍ରାମା ଚିଲୋନିସ୍ ନାମକ ଅଣ୍ଡାନାଶୀ ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ କରି ମକାଗଛ ହେବାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ୧୦ ଅନ୍ତରରେ ୬ ଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ଭଣ୍ଡାଖୁଆ ଯୋକ ଓ ଫଲ୍ ଆର୍ମିଓର୍ମ ଯୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବି.ଟି. ଜୈବ ବିଷ (ଡିପେଲ୍, ବାୟୋଡ଼ାର୍ଟ, ଡେଲ୍‌ପିନ୍) ଏକର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି:

ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

ପୋକ	ଅନୁମୋଦିତ କୀଟନାଶକ	ମାତ୍ରା (ଏକର ପ୍ରତି)	ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ
କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ	ପ୍ରୋଥେନୋଫସ୍ ୫୦% ଇ.ସି. ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୫% ଏସ୍.ସି.	୪୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ମି.ଲି.	୨ ମି.ଲି. ୧ ମି.ଲି.
ଭଣ୍ଡାଣ୍ଡା ପୋକ	ପ୍ରୁବେକ୍ସିଆମାଇଡ୍ ୩୯.୩୫% ପ୍ରୋଥେନୋଫସ୍	୪୦-୫୦ ମି.ଲି. ୪୦୦ ମି.ଲି.	୦.୨ ମି.ଲି. ୨ ମି.ଲି.
ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱର୍ମ	ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେନ୍ଜେଟ୍ ୫%ଏସ୍.ଜି	୮୦ ଗ୍ରାମ୍	୦.୪ ଗ୍ରାମ୍
ଜଉପୋକ	ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଲ.	୬୦ ମି.ଲି.	୦.୩ ମି.ଲି.
ଉଇ	କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୫୦% ଇ.ସି.	୩୦୦ ମି.ଲି.	୧-୨ ମି.ଲି.

ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ :

ରୋଗ	ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ	ମାତ୍ରା (ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନ/ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ)
ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ	କ୍ୟାପ୍ଟାନ (ବିହନ ବିଶୋଧନ) ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍+ମାଙ୍କୋଜେବ	୨.୫ ଗ୍ରାମ୍/ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ୩ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର
ନିମ୍ବମୁଖୀ ପାଉଁଶିଆରୋଗ	ମେଟାଲେକ୍ସିଲ୍+ମାଙ୍କୋଜେବ	୩ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର
କାଣ୍ଡସତ୍ତା ରୋଗ	ଥୁରାମ୍ (ବିହନ ବିଶୋଧନ) କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍	୩ ଗ୍ରାମ୍/ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ୨ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର
କଳଙ୍କି ରୋଗ	ମେଙ୍କୋଜେବ୍/ହେକ୍ସାକୋନାଜଲ୍	୨.୫ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର
ଝାଉଁଳା ରୋଗ	ଥୁରାମ୍ (ବିହନ ବିଶୋଧନ) କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍(ମାଟିକୁ ଭିଜାଇବା)	୩ଗ୍ରାମ୍/ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ୨ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର





କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
Email : kvk.gajapati@ouat.ac.in