

ଓୟୁଏଚି ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା :

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚିନାବାଦମ ରୂଷ



: ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳୀ :

ଡ. ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)



ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଶ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀରାୟ କୁକୁରି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ)

ଡ. ସୁଶୀ ଚୌଧୁରୀ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

: ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା :

ଡ. ସଂଗ୍ରାମ ପରମରାୟ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର
ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୬
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚିନାବାଦମ ଗୁଣ

ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଣ୍ଡଳୀ

ଡ. ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଶ୍ରୀ ଜାନୁଆରିୟସ୍ କୁଜୁର

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ)

ଡ. ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ

ଡ. ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି-୭୬୧୦୧୬

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଷ୍ଟହେଡ଼ :

ଡ. ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ପାଣିପାଗ)

ଶ୍ରୀ ଜାନୁଆରିୟସ୍ କୁଜୁର

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ)

ଡ. ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ)

ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ :

ଡ. ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ଓ.ୟୁ.ଏ.ଟି ପ୍ରକାଶନ ସଂଖ୍ୟା: ୨୦୨୫୦୭୦୫୨୦



ପ୍ରକାଶକ

: କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ପ୍ରକାଶ କାଳ

: ୨୦୨୫-୨୬



ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚିନାବାଦ୍ୟ ଗୁଣ

ଚିନାବାଦ୍ୟ ଏକ ତୈଳବାଜ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ । ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚିନାବାଦ୍ୟର ଆଦର ରହିଛି । ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଜି, ସିଝାଇ ଖିଆଯାଏ । ତେଲକୁ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ବନସ୍ପତି ଶିଅ ଓ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପିଡ଼ିଆକୁ ପଣ୍ଡୁ, ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର ରୂପେ ଏବଂ ଅମଳ ପରେ ଗଛକୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ (ବୋତି) ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ମଞ୍ଜିରେ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ୱେଦସାର, ପୃଷ୍ଠିସାର, ଧାତବଲବଣ (ଫସ୍ଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍), ଭିଟାମିନ୍ ବି(ଥାୟାମିନ୍, ରାଇବୋଫ୍ଲାବିନ୍, ନିକୋଟିନିକ୍ ଏସିଡ୍) ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ :

ବିଷୁବ ବା ଉପ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଚିନାବାଦ୍ୟ ଗୁଣ କରାଯାଏ । ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ୧୨୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ୫୦୦-୧୫୦୦ ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗୁଣ କରାଯାଇଥାଏ । ୨୦-୨୫ଡି.ଗ୍ରା. ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ।

ମୃତ୍ତିକା :

ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପରେ ଫୁଲର ତେଜ ତଳକୁ ନଇଁଯାଇ କଷି ଫଳଟି ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଥାଏ । ତେଣୁ ହାଲୁକା, ଉର୍ବର, ନିଗିଡା ଏବଂ ବାଲିଦୋରସା ତଥା ଅମୁତା (ପି.ଏଚ୍) ୬.୫-୭.୫ ପିଏ ମାଟିରେ ଚିନାବାଦ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ଚିନାବାଦ୍ୟ ଫସା ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନିଗିଡା ଜମି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ।

କିଷମ :

ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଚିନାବାଦ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଗଛର ପ୍ରକୃତି	ଉନ୍ନତ କିଷମ
ସିଧା ବା ଗୁଚ୍ଛ :	ଏ.କେ ୧୨-୨୪, ଟି.ଜି.୩, ଟି.ଏ.ଜି.ଆଇ.ସି.ଜି.ଏସ୍ ୧୧, କିଷାନ, ଜଞ୍ଜାନ, ସୂତି, କେ.ଏଲ୍-୨୪
ମଧ୍ୟମ ଲୋଚଣା :	କାଦିରି-୩, ଆଇ.ସି.ଜି.ଏସ୍-୪୪, କାଦିରି-୬, ଧରଣୀ
ଲୋଚଣା ବା ଧାବକ :	ପଞ୍ଜାବ- ୧, ଏମ୍-୧୩



ସିଧା ବା ଗୁଚ୍ଛ କିସମର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଭାବରେ ବଢେ ଏବଂ ଚିନାବାଦନ ମୂଳ ପାଖରେ ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇ ଫଳିଥାଏ । ମଧ୍ୟମ ଲୋଟଣୀରେ ଗଛ ସିଧା ବଢେ କିନ୍ତୁ ତାଳ ମାଟିରେ ଲାଗିଯାଏ । ଲୋଟଣୀ ବା ଧାବକ କିସମରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇ ମାଟି ଉପରେ ଖୋଳେଇ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଏହାର ତାଳ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚିନାବାଦନ ଫଳିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଲୋଟଣୀ କିସମ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ରତୁ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ କିସମଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ।

କ୍ର.ନ.	ରତୁ	କିସମ
୦୧	ବର୍ଷାରତୁ	ଏକେ ୧୨-୨୪, କିସାନ, ଜେ-ଏଲ୍-୨୪, ଆଇ.ସି.ଜି.ଏସ୍.-୧୧, ଆଇ.ସି.ଜି.ଏସ୍.-୪୪, କିକି-୨
୦୨	ରବିରତୁ	ଏକେ ୧୨-୨୪, ଜେ.ଏଲ୍.-୨୪, ଜଞ୍ଜନ, ସୃତି, କିସାନ, କାଦିରି-୨

ବିହନ :

ଗଛର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ବିହନ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ । ବିହନଗୁଡ଼ିକ ୭୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଛୋଟ, ଉଚ୍ଚା ତଥା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଚୋପାକୁ ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବା ହାତରେ ଛଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ । ମଞ୍ଜି ଛଡ଼ାଇବାର ୨, ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣିବା ଉଚିତ୍ ଅନ୍ୟଥା ଗଜା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ (୨-୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇପାରେ) । ବିହନ ବୁଣିବାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା ବିହନ ସହିତ ୩ଗ୍ରାମ୍ କାପଟାନ୍ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ବୁଣିବାର ୧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାଇଜୋବାୟମ୍ କଲଚର (R.Japonicum ବା Bradyrhizobium)ରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କଲଚର ସହିତ ୪୦୦ମି.ଲି. ପାଣି ଓ ୩ଗ୍ରାମ୍ ସୋଡିୟମ୍ ମଲିବିଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ ମଲିବିଡେଟ୍ ଏବଂ ୮୦ଗ୍ରାମ୍ ପି.ଏସ୍.ବି. ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୧୦କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଳାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଉପରବେଳା ବୁଣାଯାଏ ।

ଗଛର ପ୍ରକୃତି	ବିହନ ପରିମାଣ (କି.ଗ୍ରା./ଏକର)		ଲଗାଇବା ଦୂରତ୍ୱ (ସେ.ମି.) ଧାଡ଼ି x ଗଛ	ଏକର ପ୍ରତି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା (ଲକ୍ଷରେ)
	ମଞ୍ଜି	ଚିନାବାଦନ		
ସିଧା ବା ଗୁଚ୍ଛ	୨୮	୪୦	୩୦x୧୦	୦.୫୩
ମଧ୍ୟମ ଲୋଟଣୀ	୨୨.୫	୩୨	୪୫x୧୫	୦.୨୩
ଲୋଟଣୀ	୧୭.୮	୨.୪	୬୦x୨୦	୦.୧୩



ଚିନାବାଦ୍ୟର ଉନ୍ନତ କିସମ ସମୂହ

୧. କାଦିରି-୬ :

ଚିନାବାଦ୍ୟ କିସମ କାଦିରି ୬ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରାଲଟି ରିଲିଜି କମିଟି (SVRC) ଦ୍ୱାରା ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କିସମଟି ପରିପକ୍ୱ ହେବାପାଇଁ ଖରିଫ ରତୁରେ ୧୦୦ - ୧୦୫ ଦିନ ଓ ରବି ରତୁରେ ୧୧୦ - ୧୧୫ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ । ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ରତୁରେ ଏହି କିସମଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । କାଦିରି ୬ କିସମଟି ଉଚ୍ଚ ଫଳନଶୀଳ (ହାରାହାରି ୨୦-୨୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖରିଫ ରତୁରେ ଏବଂ ୪୦-୪୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରବି ରତୁରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା) । ଏହି କିସମର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପାଚିଥାଏ ।

୨. କାଦିରି ୯ :

ଚିନାବାଦ୍ୟ କିସମ କାଦିରି ୯ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରାଲଟି ରିଲିଜି କମିଟି (SVRC) ଦ୍ୱାରା ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କିସମଟି ପରିପକ୍ୱ ହେବାପାଇଁ ଖରିଫ ରତୁରେ ୧୨୦ ଦିନ ଓ ରବି ରତୁରେ ୧୨୫ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ । ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ରତୁରେ ଏହି କିସମଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । କାଦିରି ୯ କିସମଟି ଉଚ୍ଚ ଫଳନଶୀଳ (ହାରାହାରି ୨୦-୨୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖରିଫ ରତୁରେ ଏବଂ ୩୫-୪୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରବି ରତୁରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା) । ଏହି କିସମର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଅଧିକ ତୈଳଯୁକ୍ତ, ମରୁଡି ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟମ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାଚିଥାଏ ।

୩. ଧରଣୀ (TCGS 1043)

ଚିନାବାଦ୍ୟ କିସମ ଧରଣୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରାଲଟି ରିଲିଜି କମିଟି (SVRC) ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କିସମଟି ପରିପକ୍ୱ ହେବାପାଇଁ ୧୦୦-୧୦୫ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ । ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ରତୁରେ ଏହି କିସମଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷଧରଣୀ କିସମଟି ଉଚ୍ଚ ଫଳନଶୀଳ (ହାରାହାରି ୧୬-୨୬ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖରିଫ ରତୁରେ ଏବଂ ୩୭-୪୩ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରବି ରତୁରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା) । ଏହାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏକା ସମୟରେ ପାଚିଥାଏ ଓ ୩୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡି ସହିପାରେ ।



୪. ଧୂରାଳ (TCGS-1073)

ଚିକିତ୍ସାକାରୀ କିସମ ଧୂରାଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭେରାଇଟି ରିଲିଜି କମିଟି (SVRC) ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କିସମଟି ପରିପକ୍ୱ ହେବାପାଇଁ ୧୦୫-୧୧୦ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ । ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ଏହି କିସମଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଧୂରାଳ କିସମଟି ଉଚ୍ଚ ଫଳନଶୀଳ (ହାରାହାରି ୧୫-୨୨ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଏବଂ ୩୪-୪୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ରବି ଋତୁରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା) । ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିସମ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେଜଳ ସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କିସମ ଅଟେ ।

୫. ପ୍ରଗତି (TCGS 894):

ଚିକିତ୍ସାକାରୀ କିସମ ପ୍ରଗତି(TCGS 894)ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭେରାଇଟି ରିଲିଜି କମିଟି (CVRC) ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କିସମଟି ରବି ଋତୁରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବାପାଇଁ ୧୦୫ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ । ରବି ଋତୁରେ ଏହି କିସମଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ପ୍ରଗତି(TCGS 894)କିସମଟି ଉଚ୍ଚ ଫଳନଶୀଳ (ହାରାହାରି ୨୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା), ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିସମ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବା କିସମ ଅଟେ ।

୬. କାଦିରି ଲେପାକସି(K1812) :

ଚିକିତ୍ସାକାରୀ କିସମ କାଦିରି ଲେପାକସି(K1812) ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭେରାଇଟି ରିଲିଜି କମିଟି (CVRC) ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କିସମଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବାପାଇଁ ୧୧୨ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ । ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ଏହି କିସମଟି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । କାଦିରି ଲେପାକସି(K1812)କିସମଟି ଉଚ୍ଚ ଫଳନଶୀଳ (ହାରାହାରି ୩୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା), ଅଧିକ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ସ୍ୱେନିସ ଭେରାଇଟି, ଅଧିକ ତୈଳ ଯୁକ୍ତ (୫୧%) ଏବଂ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ । ଏହା ମରୁଡି, ରୋଗ ଓ ପୋକ ପ୍ରତିରୋଧକ କିସମ ଅଟେ । ଏପରିକି ଏହି କିସମ ଅଧିକ ମରୁଡିରେ ମଧ୍ୟ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୫- ୨୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।



ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ :

ମାଟିକୁ ୪-୫ ଓଡ଼ ଗୁଣ ତାପ କରି ଶେଷ ଓଡ଼ ତାପ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪ଟି ବଡ଼ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ମୂଳସାର ଓ ୧୦କି.ଗ୍ରା. ମିଥାଇଲ୍ ପାରାଥ୍ରାକ୍ସିନ୍ ୨% ବୁଣି ମିଶାଯାଏ । ଅମ୍ଳାୟ ମାଟିରେ ବୁଣିବାର ୧ମାସ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦କି.ଗ୍ରା. ଦୁନପଥର ବୁଣି କିମ୍ବା ୫୦୦କି.ଗ୍ରା.କଳ ମଇଳା ମିଶାଇବା ଉଚିତ୍ । ଅମ୍ଳାୟ ମାଟିରେ ପ୍ରତି ବାବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦କି.ଗ୍ରା. କ୍ରିସ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚିନାବାଦନ ଫମ୍ପା ନହେବା ସହିତ ମଞ୍ଜିର ତେଲ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ କିସମ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍ଗଳ ପଛରେ କିମ୍ବା ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ବୁଣାଯାଏ । ରତୁ ଅନୁସାରେ ବୁଣିବା ସମୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ବିଶୋଧିତ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ବତର ଥିବା ମାଟିରେ ୫ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ବୁଣି ମାଟିକୁ ସମତୁଲ କରାଯାଏ । ରବି ରତୁରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୨୦ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ସେ.ମି ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖାଯାଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟରେ ଜମିରୁ କାଢ଼ ଓ ପାରା ବିହନ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ।

କ୍ରମିକ ନଂ	ରତୁ	ଲଗାଇବା ସମୟ
୧	ବର୍ଷା	ଜୁନ
୨	ଶୀତ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର
୩	ଗ୍ରୀଷ୍ମ	ଜାନୁଆରୀ - ଫେବୃଆରୀ

ସାର ପ୍ରୟୋଗ :

ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ୧୨କି.ଗ୍ରା. ଲେଖାଏଁ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ସାର ଉପାଦାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ସମସ୍ତ ଖତ ଓ ସାରକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଆରରେ ଦେଇ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ ଅଧିକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ । କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓହଲରୁ ଖୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏବଂ ଚିନାବାଦନ ଫମ୍ପା ନହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସେହିପରି ସଲଫର ତେଲର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଚିନାବାଦନ ବୁଣିବାର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦



କି.ଗ୍ରା. ଜିପସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁଥିରେକି ୨୨.୩% କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ୧୮.୬% ସଲଫର ରହିଛି । ମାତ୍ର ପଦ୍ମପରସ୍ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପର ପଦ୍ମପେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଜିପସମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନାହିଁ । ଜିପସମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ଲଗାଇବାର ୨୦-୨୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାଡ଼ିର ୫-୭ସେ.ମି. ଦୂରରେ ୩ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯନ୍ତ୍ର :

ପ୍ରଥମ ଗଛ ଉଠିବାର ୭-୧୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୁନଶ୍ଚ ମଞ୍ଜି ଲଗାଯାଏ । ଲଗାଇବାର ୨୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଡା ଖୋସା କରି ଅନାବନା ଗଛ ବଛାଯାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ହୁଡା ଟେକି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଲୋଟଣୀ କିସମର ୩୦ଦିନ ବେଳକୁ ଆଉଥରେ ଘାସ ବଛାଯାଇପାରେ । ସିଧା କିସମ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଗଛ ହେବାର ୩୫ଦିନ ପରେ ପଶିବା ଅନୁଚିତ୍ । ଏପରି କଲେ ଓହଲ ଛିଣ୍ଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ବିହନ ବୁଣିବାର ପୂର୍ବଦିନ ପୂଜ୍ଞକୁରାଲିନ୍ ୪୮ଇସି (୮୦୦ମି.ଲି./ଏକର) କିମ୍ବା ପରଦିନ ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ ୩୦ଇସି (୧୩୦୦ ମି.ଲି./ଏକର) କିମ୍ବା ଅକ୍ସିପ୍ଲୁରୋଫେନ୍ ୨୩.୫ ଇସି (୫୦୦ମି.ଲି./ଏକର) ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅନାବନା ଗଛ କମ୍ ଉଠିଥାଏ ।

ବର୍ଷାଦିନିଆ ବିନାବାଦନରେ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ । ମାତ୍ର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଲେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ଖରାଟିଆ ଚିନାବାଦନରେ ୭-୧୦ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ସର୍ବାଧିକ ପୁଲ ଧରିବା ସମୟ, ଓହଲ ମାଟିରେ ପଶିବା ତଥା ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜଳସେଚନ କଲେ ଅମଳ ବଢ଼ିଥାଏ । ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କଲେ ଅମଳରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ।

ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା :

୧) ଟୀକା ରୋଗ :

ପତ୍ରରେ ଓ କାଣ୍ଡରେ ବାଦାମୀରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ତଳ ପତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରେ ଉପର ପତ୍ରକୁ ଆସେ ।



ଏହି ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ପରସ୍ପର ମିଶିଯାନ୍ତି, ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ଝଡ଼ିପଡ଼େ ଓ ଅମଳ କମିଯାଏ । ଗଛ ୨ ମାସ ହେବା ବେଳକୁ ଏହି ରୋଗ ଲାଗିଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା :

ଟାକା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମଞ୍ଜିରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍/୧୦ ମିଲି. ସୁଡୋମୋନାସ୍ ପ୍ଲେରୋସେନ୍ସ ୦.୫% ଡବ୍ଲୁ.ପି./୧.୫% ଏ.ଏସ୍. କିମ୍ବା ୪ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡେ କିମ୍ବା ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାପ୍ଟାନ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଫସଲରେ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦-୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଗନ୍ଧକ ୮୦ ଡବ୍ଲୁ.ପି. କିମ୍ବା ୬୦୦ ମିଲି. ହେକ୍ସାକୋନାଜଲ ୫% ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୨୦୦-୩୦୦ ମିଲି. ଟେବୁକୋନାଜଲ ୨୫.୯% ଇସି. କିମ୍ବା ୪୦୦-୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧୨% +ମାକ୍ନୋଜେବ୍ ୬୩% କିମ୍ବା ୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସହନଶୀଳ କିସମ ଟି.ଏ.ଜି. ୨୪ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୨) ଗଜା ସତ୍ତା ରୋଗ :

ଏହି ରୋଗ ମଞ୍ଜି ଓ ମାଟିରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଭିତର ଗଜାଟି ମରିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗଜାହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ବାଜ ପତ୍ର ଦୁଇଟି ପାଖରେ କଳା ଫିମ୍ପି ମାଡିଯାଇ ତାହା ସଢ଼ିଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା :

ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସାବଦନ ନ କରି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ । ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି ବୁଣିବା ଉଚିତ୍ । ରୋଗ ନିରୋଧକ କିସମ ଜେ-୧୧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଫସଲରେ ରିଡୋମିଲ ଏମ୍.ଜେଡ୍ (୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍/ଏକର) ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ।

୩) କାଣ୍ଡ ପତାରୋଗ :

ଗଛର ମୂଳ ପାଖରୁ କାଣ୍ଡ ସଢ଼ିଯାଇ ଫିମ୍ପି ମାଡିଯାଏ । ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ । ଫଳ ଓ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା କାଣ୍ଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଖରା ଓ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଦଳ ବଦଳ ଭାବରେ ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ହୁଏ ।



ପରିଚାଳନା :

ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଗଛ ମୂଳରେ ମେଟାଲାଇଜ୍ + ମାଲ୍‌କୋଜେବ୍ (୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ / ଏକର) ସ୍ତ୍ରୋ କରାଯାଏ ।

୪) କଳଙ୍କି ରୋଗ :

ପ୍ରଥମେ ପତ୍ରର ତଳପଟେ ଇଷଡ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲୁହା କଳଙ୍କି ପରି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା :

ଫସଲରେ କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ (୪୪୦ ଗ୍ରାମ୍ / ଏକର) ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ।

୫) ଜଉ ପୋକ :

ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋକ କଅଁଳ ଅଗିଲା ଡାଳରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଲୋଚାକୋଚା ହୁଏ ଓ ଫଳ ଶୁଖିଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା

ଫସଲରେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (୪୦୦ ମି.ଲି. / ଏକର) କିମ୍ବା ମିଥାଇଲ୍ ଡିମେଟନ୍ ୨୫ଇସି (୪୦୦ ମି.ଲି. / ଏକର) ସ୍ତ୍ରୋ କରାଯାଏ ।

୬) ନାଲି ସଂବାଲୁଆ

ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ଚିନାବାଦାମ ଗଛର ପତ୍ର ତଳେ ସଂବାଲୁଆ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି । କଳା ମୁଣ୍ଡ ଓ ଇଷଡ୍ ହଳଦିଆରୁ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ସଂବାଲୁଆ ଗୁଡିକ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଖାଇ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ପରିଚାଳନା :

ଫସଲରେ କ୍ୟୁନାଲଫସ୍ ୨୫ଇସି (୪୦୦ ମି.ଲି. / ଏକର) ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ।

୭) ପତ୍ର ସୁଡଙ୍ଗୀ ପୋକ :

ଶୁକ୍ଳଗୁଡିକ ପତ୍ର ଭିତରେ ପଶି ସବୁଜ ଅଂଶ ଖାଇଥାନ୍ତି । ପତ୍ରରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାର ପଡ଼ିବା ପରି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ । ପରେ ଶୁକ୍ଳ-୨-୩ ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ଜାଲ ବାନ୍ଧି ଲୁଚି ସବୁଜ ଅଂଶ ଖାଇଥାଏ ।



ପରିଚାଳନା :

ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ଫସଲରେ ଗ୍ରାହ୍ୟଜୋତ୍ ୪୦୦ସି
(୪୦୦ମି.ଲି. / ଏକର) ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ।

୮) ଉଜୁଣୀ ପୋକ :

ଏହି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ ପତ୍ର ଭିତରେ ରହି ରସ କୋରି ଖାଇବାରୁ ପତ୍ର
ଲୋଚା କୋଚା ହୋଇଥାଏ । ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଶୁଖିଯାଏ । ଫେବୃଆରୀ ରୁ ମେ
ମାସ ଯାଏଁ ଏହି ପୋକ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା :

ଫସଲରେ ଡାଇମିଥୋଏଟ୍ ୩୦୦ସି କିମ୍ବା ମିଥାଇଲ୍ ଡିମେଟନ୍ ୨୫୦ସି
(୪୦୦ମି.ଲି. / ଏକର) ସ୍ତେଷ କରାଯାଏ ।

୯) ଧଳା ମାଛି :

ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ତଳପଟେ ରହି ରସ ଶୋଷି ଖାଇବାରୁ
ପତ୍ର ଲୋଚା କୋଚା ହୋଇଯାଏ । ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ
କରିଥାନ୍ତି ।

ପରିଚାଳନା :

ଫସଲରେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ (୮୦ ମି.ଲି. / ଏକର) ସ୍ତେଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

୧୦) ବିହାରୀ ସଂବାଲୁଆ :

ପତ୍ର ତଳେ ଟୟୋଫସ୍ (୪୦୦ ମି.ଲି. / ଏକର) ସ୍ତେଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

୧୧) ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ :

ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ତଳେ ରହି ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି ।
ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ ।



ପରିଚାଳନା :

ଫସଲରେ ଲମ୍ବିତାକୁପ୍ରତି ୨୦୦ ଏସ୍.ଏଲ୍.(୮୦୦ ମି.ଲି. /ଏକର)
ସ୍ତ୍ରୋ କରାଯାଏ ।

୧୨) ଅଷ୍ଟପଦି ପୋକ :

ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଏବଂ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୋକ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ
ଅଂଶରୁ ରସ ଶୋଷିବାରୁ ପତ୍ର ପାଉଁଶିଆ ପଡ଼ି ଅମଳ କମିଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା :

ଫସଲରେ ତାଲକୋଫଲ୍ ୧୮.୫ଇସି (୪୦୦ମି.ଲି./ଏକର) ସ୍ତ୍ରୋ
କରାଯାଏ ।

୧୩) ଧୂଆଁ ପତ୍ର ସଂବାଲୁଆ :

ସଂବାଲୁଆର ଦେହ ଚିକ୍କଣ ଓ ଦୁଇ ଧାରରେ କଳାଦାଗ ରହିଥାଏ ।
ଏମାନେ ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ଲଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତି ।

ପରିଚାଳନା :

ଫସଲରେ ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ ୫୦%ଇସି (୪୦୦ମି.ଲି. /ଏକର) ସ୍ତ୍ରୋ
କରାଯାଏ ।

୧୪) ଧବଳ ଶୃଙ୍ଗା ପୋକ : ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଚେରଖାଏ ।

ଚେର ଛିଣ୍ଡିବାରୁ ଗଛ ଝାଉଁଳି ମରିଯାଏ ।

ପରିଚାଳନା :

ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୧୨କି.ଗ୍ରା. କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍
୧.୫%ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

୧୫) କାନ କୁଟୁଳୀ ପୋକ :

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପାକଳ ବାଦାମକୁ କଣା କରି ମଞ୍ଜି ଖାଇସାରିବା
ପରେ ସେଥିରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ ।





ପରିଚାଳନା :

କ୍ଲଷ୍ଟରପାଲ୍‌ଲିଫ୍ ୧.୫ % ଗୁଣ୍ଠ (୧୦କି.ଗ୍ରା./ଏକର) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଅମଳ :

ଜିସମ ଓ ରତ୍ନ ଅନୁସାରେ ବୁଣିବାର ୧୫-୧୫୦ଦିନରେ ଚିନାବାଦନ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ଫଳଦିଆ ହୁଏ, ମଞ୍ଜିର ଚୋପା ପାଟଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଚୋପାର ଭିତର ପଟରେ କଳାରାଶି ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ଧାରଣର ୨ମାସରେ ଫଳ ପାକଳ ହୋଇଥାଏ । ମାଟିରେ ପାଗ ସୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ହାତରେ ଟାଣି ଅମଳ କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟଥା ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ଫଳଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ରଖାଯାଏ । ଏକର ପ୍ରତି ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଫସଲରୁ ୪-୫କିଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଫସଲରୁ ୮-୧୦ କିଣ୍ଡାଲ ଶୁଖିଲା ବାଦାମ ମିଳିଥାଏ ।







Training programme on seed production and primary processing of Groundnut



Vegetative stage



Flowering stage



Pod Development stage



Field Day of CFLD on Oilseeds (Groundnut)



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
email : kvk.gajapati@ouat.ac.in

