

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ଧାର



ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ମହାରଣା
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ରୋଗପୋକ)

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି



ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୦୩



ସମନ୍ୱିତ ରୋଗଯୋକ ପରିଚାଳନା

ଧାନ

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ମହାରଣା

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ରୋଗ ଯୋକ)

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ. ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି



ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା - ଧାନ

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ମହାରଣା

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ରୋଗ ପୋକ)

ଡଃ. ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ପ୍ରକାଶକ :

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି, ରା.ଉଦୟଗିରି


ପ୍ରକାଶ କାଳ : ୨୦୧୮

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗଯୋଜ ପରିଚାଳନା - ଧାନ

ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିଯୋକ ଓ ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡିଯୋକ (BPH & WBPH) :

ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିଯୋକ ଧାନ ଫସଲର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଫୁଲ ଉଡେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । ଏମାନେ ଗଛର ମୂଳ ଅଂଶରେ, ପାଣି ଉପରେ, କାଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯୋକ । ଉଭୟ ବୟସ୍କ ଯୋକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଫସଲରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ପରେ ଶୁଖିଯାଏ । ହିଡ଼ରୁ ଥାଇ ଦେଖିଲେ କିଆରିରେ ମଲା ମଲା ହୋଇ ଧାନ ପୋତି ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ମଳାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପୂରା କିଆରିଟି ଜଳିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ ହପର୍ ପୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଜଉଆ ଯୋକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ଅର୍ଦ୍ଧକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋକମାନେ ଧାନ ଗଛର ଭୂଳ ଅଂଶରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଧାନ ଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଧାନ ଫସଲ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚକଡ଼ା ପୋଡ଼ା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ ପରି ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନୁରୂପ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ । ଏହି ଯୋକର ଦୁଇତେଣାରେ ଏକ ଧଳା ପଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ । ଉଭୟ ଅର୍ଦ୍ଧକ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋକ ଗଛର ମୂଳରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି ।



ଫଳରେ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି କ୍ରମଶଃ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ । ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଶୁଖି ମରିଯାଏ । କୀଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଦୂରରୁ ବାଦାମୀରଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

କାହାଳିଆ ପୋକ ବା ବଙ୍ଗୀ ପୋକ (Gall midge) :

କାହାଳିଆ ପୋକ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଭାରି କ୍ଷତିକାରକ । ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଏହି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶି ଦେଖାଯାଏ । ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପୋକ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ପେଁକାଳିଆ ମାରିଯିବା ବା ବା ସଞ୍ଚା ମାରିଯିବା କହିଥାନ୍ତି । ମେଘୁଆ ପାଗ ବା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଏ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକମାନେ ଇଷଡ଼ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗର ମଶାପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏମାନେ ଦୁଇରୁ ପାଞ୍ଚଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଜଳକଣା ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ମା' ପୋକ ତାର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୫୦ ରୁ ୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦିଏ । ଅଣ୍ଡାରୁ ୩ ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ ବାହାରେ ଓ ପତ୍ର ସହି ଦେଇ ଗଛ ମଞ୍ଜର ମୂଳ ଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ରସ ଛାଡ଼େ । ଫଳତଃ ପିଲଟି ଆଉ ନୂଆପତ୍ର ପାଇ ନପାରି ପିଆଜ ସଞ୍ଚା ସଦୃଶ ହୋଇ ବଢ଼େ । ଏହି ପୋକ ଧାନର କେବଳ ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କ୍ଷତି ଘଟାଏ ।

କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ (Stem Borer) :

ଧାନ ଫସଲର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ପୋକ । ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପୋକକୁ ଗଣ୍ଡିବିନ୍ଧା ପୋକ ବା ବଗପକ୍ଷିଆ ପୋକ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୋକ ଫସଲର ବିଭିନ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । କିନ୍ତୁ ତଳି ଓ ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିକରେ । ମା' ପୋକ ଧାନପତ୍ର ଉପରେ ଓ ତଳେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଗୁଚ୍ଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖରା, ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା' ପୋକ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କେଶ ଗୁଚ୍ଛ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କରି ରଖେ । ଗୋଟିଏ ମା' ପୋକ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଶୁକମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି । ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧାନ ପତ୍ର ଉପରେ ଚଲାବୁଲା କରି ସବୁଜ ଅଂଶ କୋରି ଖାଆନ୍ତି । ପରେ ସେମାନେ ପତ୍ର ସହି ମଧ୍ୟଦେଇ କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡରେ ଛିଦ୍ର କରି ଗଛ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ କାଣ୍ଡ ଭିତରର ତନ୍ତୁକୁ କାଟି ଖାଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ



କାଣ୍ଡ ଭିତର ପୋଲା ହୋଇଯାଏ ଓ ମଞ୍ଜ ପତ୍ରଟି ଶୁଖି ମରିଯାଏ । ଏହାକୁ ମଲାମଞ୍ଜ ବା ମଞ୍ଜକିଳା କୁହାଯାଏ । ହାତରେ ଟାଣିଲେ ଏହି ମଲାମଞ୍ଜ ପତ୍ରଟି ସହଜରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ । କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଧଳା କେଣ୍ଡା ବା ବଗପକ୍ଷିଆ କେଣ୍ଡା ବାହାରେ । କେଣ୍ଡାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗାଧିଆ ହୋଇଯାଏ ।

ନଳୀପୋକ (Case Worm) :

ଏହା ଖରିପ୍ ଧାନ ଫସଲର ଏକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକ । ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୋକ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର । ପକ୍ଷ ଉପରେ ବାବାମୀ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ଥାଏ । ଏହି ପୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିଥିବା ଜମି ବା ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ବେଶି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।



ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଏହି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ମା ପୋକ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଧାନ ପତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା କରି ଅଣ୍ଟା ଦିଏ । ସାଧାରଣତଃ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୫୦ଟି ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ । ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଶୁକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଶୁକମାନେ ଧାନ ପତ୍ରର ଅଗକୁ କାଟି ନଳୀ ତିଆରି କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହନ୍ତି । ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନଳୀ ପୋକ କହନ୍ତି । ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରର ସବୁଜ ଅଂଶ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ପରି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ । ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଥର ନିର୍ମୋଚନ ପରେ ପତ୍ର ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶଲଭରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପତ୍ର ନଳୀ ବୁଦାର ମୂଳ ଭାଗରେ ପାଣି ସ୍ତର ନିକଟରେ ଝୁଲୁ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ (Leaf Folder) :

ଧାନ ଗଛରୁ ଖାଉଥିବା ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ପ୍ରଧାନ । ଏହି ପୋକ ଉଭୟ ଖରିପ୍ ଓ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ଫସଲର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି । ଶୁକ ଧାନ ପତ୍ରର ଦୁଇ ଧାରକୁ ଓ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇ ଚାରିଟି ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି କିମ୍ବା ଅଗକୁ ନୁଆଁଇ ନାଳ ରସ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ଗୁଡାଇ ନଳୀପରି କରି ତା ଭିତରେ ରହେ ଏବଂ ତାର ସବୁଜ ଅଂଶକୁ କୋରିଖାଏ । ଏହି ଶଲଭଟି



ଦେଖିବାକୁ ହଳଦୀ ମିଶା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର । ଶୁକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ ପତ୍ରରେ ଲମ୍ବାଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳାଦାଗ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଦିଶେ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖରାରେ ଶୁଖିଯାଏ । ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକ ଫିକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ।

ଗନ୍ଧିଯୋକ (Gandhi Bug) :

ଏହାକୁ ଚାଷୀମାନେ ମହୁଆ ଯୋକ ବୋଲି କହିଥାଆନ୍ତି । ଧାନ କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ସମୟରେ ଏହି ଯୋକଗୁଡ଼ିକ ଧାନର ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କେଣ୍ଡା କଳା ଦେଖାଯାଏ ଓ କେଣ୍ଡାରେ ଅଗାଧି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନରୁ ମଲା ଚାଉଳ ବାହାରେ । ଫସଲରେ ଏହି ଯୋକ ଲାଗିଥିଲେ ଜମି ପାଖକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗନ୍ଧୀଯୋକ କୁହାଯାଏ ।




କେଣ୍ଡାକଟା ଯୋକ (Cut Worm) :

ଏହି ଯୋକମାନେ ଧାନ ଫସଲରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ନଯାଇ ବେଳେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି । ଆଉ ଧାନ ଫସଲର ଅଶେଷ କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ଶୁକମାନେ ଦିନରେ ଧାନ ବୁଦା ମୂଳରେ କିମ୍ବା ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି । ଏମାନେ ରାତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଧାନପତ୍ର ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଣ୍ଡାର ପାଖୁଡାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି । ଧାନ ଗଛର ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଳ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼େ ।


ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଂପର୍କରେ :

ମହିଷା ରୋଗ (Blast) :

ଏହା ମଞ୍ଜିରୁ ସଂକ୍ରମିତ ଏକ କବକଜନିତ ରୋଗ । ତଳି କିଆରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ପାଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇପାରେ । ଫସଲର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳି, ପିଲ ଦେବା ଓ



କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଧାନପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିପତା ଦାଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଓ ପରେ ପରେ ଏହା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାକୁଡ଼ି ପରି କିମ୍ବା ଆଖୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଚାରିକଡ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଝି ଅଂଶ ପାଉଁଶିଆ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ମଝି ଅଂଶ ଚଉଡ଼ା ଓ ଦୁଇମୁଣ୍ଡ ସରୁଆ ନାଆ ପରି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରରେ ଦାଗ ମିଶିଯାନ୍ତି । ଫଳରେ ପୁରା ପତ୍ରଟି ଝାଉଁଳି ଯାଏ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ପୋଡ଼ାଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ।



ମୂଳସଜ୍ଜା ରୋଗ (Foot rot) :


ଏହି କବକଜନିତ ରୋଗ ତଳି କିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତଳି କିଆରିରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ମରିଯାଏ । ଧାନ ରୋଇବା ପରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦବିଯାଇ ସରୁଆ ଓ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ ଓ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ । ରୋଗିଣୀ ଗଛର ମୂଳ ସଢ଼ିଯାଏ ଓ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଚେରଗୁଡ଼ିକ ପଟି କଳା ଦିଶେ । ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିରହେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଗାଡ଼ିଆ ବାହାରେ ।

ରୋଗପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକୁ ଏତାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ (Sheath Blight)

:

ଏହି ରୋଗ ଧାନର ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ, ଧାନ ପତ୍ରର ମୂଳ ଅଂଶ ବା ପତ୍ରାଛାଦରେ ପ୍ରଥମେ ମାଟିଆ ମିଶା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ବା ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ମଝିଭାଗ ଧୂସର ଓ ବାହାର ଅଂଶ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ଦେଖାଯାଏ । ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ଦେଖାଯାଏ । ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ସାପକାତି ପରି ଦିଶନ୍ତି ।



ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଛର କେଣ୍ଡା ଅଗାଧିଆ ହୋଇଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୋରିଷ ଦାନାପରି କବକ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ବାଜାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ (BLB) :

ଏହା ଏକ ବାଜାଣୁଜନିତ ରୋଗ । ପତ୍ରର ଦୁଇପାଖରେ ହଳଦିଆରୁ ନଡ଼ା ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଦିଏ । ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଧାନର ପତ୍ର ଧାର ଅଗ ଆଡୁ ତଳ ଆଡକୁ ଢେଉ ଢେଉକା ଭାବେ ଶୁଖିଯାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପତ୍ରଟି ଶୁଖି ମରିଯାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ପତ୍ର ଧୂସର ହୋଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଖସି ପଡେ ଓ ପିଲ ଝାଉଁଳି ଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଖସି ପଡେ ଓ ପିଲ ଝାଉଁଳି ଯାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । କେଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ । ହେଲେ କେଣ୍ଡା ଶୁଖି ଅଗାଧିଆ ହୋଇଯାଏ । ଏହାକୁ କ୍ରେସକ୍ (Kresak) ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଧାନ ତଳି ରୋଇବାର ସପ୍ତାହଠାରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଉତ୍ତମ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ତଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ଉଡେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଏ ।

ସାଆର ରୋଗ (False Smut) :

କବକ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଏହି ରୋଗ ଧାନକେଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । କେଣ୍ଡାରେ ଅଳ୍ପ କେତେଟି ଧାନ ଏହି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ଦାନା ପାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ । କେଣ୍ଡାର ଧାନ ମେଞ୍ଚାଏ



ରେଶୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ରେଶୁର ବାହାର ପଟ ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ ଓ ଭିତର ପଟର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ନାରଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଶକୁ ନିଖରେ ଛଡ଼ାଇଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରେ । ଏହି ରୋଗ ଧାନର ଫୁଲ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ ।

ପରିବେଶବନ୍ଧୁ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା

(Integrated Pest Management) :

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ଏକ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ପରିବେଶ

ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କିତ ରୋଗଯୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଣାଶୁଣା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରୋଗଯୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଅପଲମ୍ବନ କରି ରୋଗ ଯୋକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖି ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହା ଏକ ମିତବ୍ୟୟୀ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ସମନ୍ୱିତ ରୋଗଯୋକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ :

ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗଯୋକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :-

ରୋଗଯୋକ ସହଣୀଶକ୍ତି ଥିଲା ବିହନର ବ୍ୟବହାର

Disease & Pest Tolerance Varieties

ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ (Bph & Wbph) : ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ଯୋକର ଆକ୍ରମଣକୁ ସହିପାରିଲା ଭଳି ଧାନ ବିହନ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଅନଙ୍ଗ, ପଥରା, କୋଣାର୍କ, ଗୌରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି, ତପସ୍ୱିନୀ, କାଞ୍ଚନ, ପ୍ରାଚୀ, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ମହାନଦୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ।

ମହିଷା ରୋଗ (Blast) : ସଙ୍କର, ପାରିଜାତ, ପଥରା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ଅନଙ୍ଗ, ସାସନ୍ତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଚୀ, ମହାନଦୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଲଲାଟ କିସମର ଧାନ ମହିଷା ରୋଗ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହିପାରେ ।

କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଯୋକ (Stem Borer) : ସଙ୍କର, ପଥରା, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ଉଦୟଗିରି, ଲଲାଟ, କୋଣାର୍କ, ସାମନ୍ତ, ଖାରବେଳ ।

କାହାଳିଆ ଯୋକ / ବଙ୍ଗୀ ଯୋକ (Gall Midge) : କାହାଳିଆ ବା ବଙ୍ଗୀ ଯୋକର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁଥିବା ବିହନ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ହୀରା, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ଲଲାଟ, କୋଣାର୍କ, ଭଞ୍ଜ ସାମନ୍ତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି, ଗାୟତ୍ରୀ, ଅନଙ୍ଗ ଓ ଲଳିତଗିରି ।

ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଯୋକ (Leaf folder) : ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଯୋକକୁ ସହିପାରିଲା ଭଳି ଧାନ ବିହନ କିସମ ସବୁ ହେଲା - ମହାନଦୀ, ଗଜପତି, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ପ୍ରାଚୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କାଞ୍ଚନ ।

ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ (BLB) : ଗାୟତ୍ରୀ, କାଞ୍ଚନ, ସାମନ୍ତ, କୋଣାର୍କ, ଭୋଲ, ସାରଥୀ, ପଥରା, ଅନଙ୍ଗ ଓ ଆଇ.ଆର୍-୩୬ ଆଦି ଧାନ କିସମର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ।

ପତ୍ରଛାଦ ରୋଗ (Sheath blight) : ଶ୍ରୀବତୀ, ଲଲାଟ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଉର୍ବଶୀ କିସମର ଧାନ ପତ୍ରଛାଦ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣକୁ ସହିପାରେ ।

୧. ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃତୀକ୍ଷ (Timely Inter-culture) :

ଫସଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃତୀକ୍ଷ ବା ଅନାବନା ଘାସ ବଛାବଛି କରିବା ଦରକାର ।



୨. ଖରାଟିଆ ଚାଷ (Summer ploughing) :

ଖରାଟିଆ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜମିରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ଫସଲର ମୂଳି, ଅନାବନା ଏଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଓ କୀଟମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଆସି ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା କେତେକ ପକ୍ଷୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ।

୩. ହିତ କଟି କରିବା (Trimming of bunds) :

ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ । ଜମିକୁ କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷେତର ଚାରିକଡର ହିତକୁ କୋଦାଳ ଦ୍ଵାରା କଟି କରାଯାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଘାସଲଗାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟକୁ ମାଡି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ପୋକମାନେ ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

୪. ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ନୀରୋଗୀ ବିହନର ବ୍ୟବହାର (Use of Healthy Seeds) :

ନୀରୋଗୀ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନେକାଂଶରେ ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫସଲକୁ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

୫. ବିହନ ବିଶୋଧନ (Seed Treatment) :

ସୁସ୍ଥ ବିହନ ବାଛିବା ପରେ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଜରୁରୀ । ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିହନ ବିଶୋଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା - କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍,

କାପଟାନ୍, ଥିରାମ୍, କାର୍ବୋଜିନ୍, ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ନେଇ ବିହନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବିଶୋଧକ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହିଷା ଓ ପତ୍ରପୋତା ପରି କବକଜନିତ ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଫିଙ୍ଗିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣିପାଣି ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ୬୦ ଗ୍ରାମ୍ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ବିହନକୁ ବୁଡେଇ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ବିହନକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।

କାହାଳିଆ ପୋକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳି ବିଶୋଧନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମିଲି କ୍ଲୋରପାଇରଫସ୍ ମିଶାଇ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଳିକୁ ୧୨ ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଚେର ବୁଡ଼ା କରି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ । ଏହା ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ ମିଶାଇ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଚେର ବୁଡ଼ା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି କୀଟନାଶକ ରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି କାମ କରି ତଳି ରୋଇବାର ୨୨ ରୁ ୨୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ ।

ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଣିବା ବା ରୋଇବା (Timely sowing or transplanting) :

ଫସଲ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଣାଯାଏ ବା ରୁଆଯାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଆଗୁଆ ବୁଣିବା କିମ୍ବା ରୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମୟ ବେଳକୁ ଫସଲ ଉପେଇ ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ କମ୍ କ୍ଷତି ହୁଏ । ଡେରିରେ ବୁଣିଲେ ବା ରୋଇଲେ କାହାଳିଆ ପୋକ ଓ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପରି କୀଟ ଫସଲର ବଢ଼ୁଛି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ।

କ୍ଷେତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବା

(Maintenance of plant population) :

ଧାଡ଼ିଦୁଣା ହେଉ, ରୁଆ ହେଉ ବା ଛଟାବୁଣା ହେଉ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ଜମିରେ ଯେତିକି ଗଛ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଗଛ ରହିଲେ ଭଲ । ବିଲମ୍ବ କିସମ ଧାନ ପାଇଁ ୧୫x୨୦ ସେ.ମି.ରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରୁହେ । କ୍ଷେତରେ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଠିକ୍ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରେ ଓ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଥାଏ ।

ଡିଆଁ ଧାଡ଼ିରେ ରୋଇବା (Skip Row Method) :

ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ (BPH) ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଆଁ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ରୁଆଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫/୨୦ ଧାଡ଼ି ରୋଇବା ପରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହୁଏ । ଉତ୍ତାପ ବେଶୀ ବଢ଼େ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବିଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । କେତେକ ଏହାକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଛାଡ଼ିବା (Alley ways) କହିଥାନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଳ କମି ନଥାଏ ବରଂ ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିହୁଏ ।

ସୁଷମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ (INM) :

ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଜୈବିକ ଖତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜମିର ଉର୍ବରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଗଛ ଛନଛନ ହୋଇ ବଢ଼େ ସତ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ହୁଏ । ତେଣୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରକୁ ଥରକରେ ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଭାଗ ଭାଗ କରି ୩ ରୁ ୪ ଥରରେ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଯୁରିଆ ସହିତ ନିମ୍ନ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ପକାଇଲେ ଫସଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଜମିରେ ପଟାସ୍ ସାରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ଫସଲର ରୋଗପୋକ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ ।

ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା (Water Management) :

ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ ଫସଲକୁ ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଜମିରେ ଜଳନାଳୀ କରି ଫସଲରେ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ପାଣି ମଡ଼ାଇଲେ ଫସଲକୁ ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରି ହୁଏ ଓ ଅମଳ ବି ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ ।

ସମନ୍ୱିତ ଦୃଶ୍ୟ ପରିଚାଳନା (Integrated weed management) :

ଅନାବନା ଗଛ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାଏ । ଜମିରୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଗ୍ରହଣ କରି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବଢ଼େ । ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ ଶତ୍ରୁକୀଟମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲର କ୍ଷତି

ଘଟାନ୍ତି । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃଚାଷ କଲେ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିହୁଏ ।

ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଚକ୍ର ବା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ (Crop Rotation) :

ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମ୍ବାର ଧାନ ପରେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ସେହି ଫସଲକୁ ଅନେକ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସେହି ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ ରୋଗ ପୋକର ଆକ୍ରମଣରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିହୁଏ ।

ଫସଲର ମୂଳି ନଷ୍ଟ କରିବା (Destruction Of Stubble) :

ଫସଲକୁ ମାଟି ଉପରୁ ୪ ଓ ୬ ଇଞ୍ଚ କାଟିଦେଲେ ଏହା ମୂଳି ଭାବେ ରହିଯାଏ । ଏହି ଫସଲର ମୂଳିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁକୀଟର ଶୁକ ଓ କୋଷା ଆଦି ରହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଚାଷ କରି ମୂଳିଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋତି ଦେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ଚାଷୀ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ।

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି (Mechanical Method) :

ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳିର ଅଗ ଛିଡାଇ ବା କାଟି ରୋଇବା ଦ୍ଵାରା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ନଳୀପୋକ, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକର ଶୁକ ଗଛର ଝଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷେତରେ ଅଧିକ ପାଣି ପୁରାଇ ଦଉଡ଼ି ଧରି ଟାଣି ଆଣିବା ହେଉଛି ଫଳପ୍ରସ୍ତ ପଦ୍ଧତି । ପତ୍ର ଉପରେ ରହୁଥିବା କୀଟମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜ, ପୋକ ଶୁକ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫସଲର ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।

ଆଲୋକ (Light Trap) :

ଜମିରେ ୧-୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଏକ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇ ତଳେ କିରୋସିନ୍ ଓ କୀଟ ନାଶକ ମିଶା ପାଣି ପାତ୍ର ରଖାଯାଏ । ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଶତ୍ରୁକୀଟମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଓ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ମରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ରାତିରେ ନିଆଁହୁଳା ଜାଳନ୍ତି ।

ସଂଗ୍ରହ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର (Pheromone Trap) :

ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥା ତାହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଫସଲରୁ ଏକ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ଟି ସଂଗ୍ରହ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇଲେ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଚରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୁରୁଷ କୀଟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ି । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାରି ଦିଆଯାଏ । ଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ କୀଟମାନେ କ୍ଷେତରେ ଥାଇ ସଂଗମହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ ।

ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ବାଉଁଶ ଯନ୍ତ୍ର (Bamboo cage cum percher) :

ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ବାଉଁଶରୁ କ୍ଷେତରେ ପୋତିଲେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବସୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ କ୍ଷେତରେ ଥିବା କୀଟମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ।

ଜୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି (Biological control method) :

ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦ ହଜାର ଗୁଳଜୋଗ୍ରାମା ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଧାନ ରୁଆର ଏକ ମାସ ପରେ ୬ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୬ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ପତ୍ରମୋଟା ପୋକ ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଛଡ଼ା କେତେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କବକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି । ଯେପରିକି ବିଭଜକେରିଆ ବେସିଆନା ଓ ମୋଟାରାଲ୍‌ଜିଆ ଇିସିସ୍ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଳଜୋଗ୍ରାମା ଭିରିଡେଜାତୀୟ କବକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଲସଡ଼ା ରୋଗ ଓ କାଣ୍ଡସଡ଼ା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନାର ସର୍ବଶେଷ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ :-

ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି (Chemical control method) :

ଚଳିଯିବାରେ :

କାନ୍ଥାଳିଆ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ମନୋକ୍ରେପାସ୍ ୩୬% ଏସ୍.ଏଲ / କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଲ.ସି.ଫ୍ଲୁପ୍ରେନିଲ ୫% ଏସ୍.ସି ୨ ମି.ଲି. ଫେନିଟ୍ରୋଥ୍‌ଆନ ୫୦% ଲ.ସି ୨ ରୁ ୨.୫ ମି.ଲି. ଚଳି ଘେରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ଚଳି ଉପାଦିବାର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦାନାଦର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯଥା ଫୋରେଟ-୧୦ ଜି

୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବା କାର୍ବୋୟୁରାନ୍ - ୩ ଜି ୧୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବା କାର୍ବୋ
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ - ୪ ଜି ୧ କିଲୋ ୧୦ ଡେସିମିଲ ଡଲି ଘେରାରେ
ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ଡଲି ଚେରକୁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇ.ସି
ଦ୍ରବଣରେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ବିଶୋଧନ
କରି ରୋକିବା ଭଲ ।

ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ :

କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାହାଳୀଆ, ପତ୍ରମୋଡା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି
୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋୟୁରାନ୍ - ୩ ଜି, ବା ୧୦ କିଗ୍ରା କାର୍ବୋ
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ-୪ ଜି ବା ଡାୟାଜିନିନ-୧୦ ଜି ୪ କି.ଗ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ
କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ରୁ ୨ ମି.ଲି
ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ ୩୬% ଏସ୍.ଏଲ ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ ୫% ଏସ୍.ସି ୨ ମି.ଲି ବା
ଲାର୍ଡା ସାଇହାଲୋପ୍ରିନ୍ ୨.୫% ଇ.ସି ୨.୫ ମି.ଲି ବା ଇଥୋଫେନପ୍ରକ୍
୧୦% ଇ.ସି ୨.୫ ମି.ଲି ଫୋସାଲନ ୩୫% ଇ.ସି ବା ୨ ମି.ଲି
କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇ.ସି ୨ ମି.ଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ।

ନଳୀ ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ :

ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିଫେଟ ୭୫% ଏସ୍.ପି ବା ୨ ମି.ଲି
ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ ୩୬% ଏସ୍.ଏଲ ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇ.ସି
ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଓ ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର
ପ୍ରତି ୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋରିଲ ୫୦% ସେଚିଡ ଗୁଣ୍ଡ ବା ମନୋକ୍ରୋଟୋଫସ୍ ୩୬%
ଏସ୍.ଏଲ ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇ.ସି ବା ଫେନୋବ୍ୟୁକାର୍ବ ୫୦%
ଇ.ସି ବା ଫୋସାଲନ ୩୫% ଇ.ସି ୨ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ବା ୫ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ ବା ଆକ୍ସୋମେଥୋକ୍ସାମ
୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି ୧ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ କନ୍ଦିକରି ଗଛର ମୂଳଅଂଶକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା
ଉଚିତ୍ ।

କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ସମୟରେ ଗନ୍ଧିପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ
୨ ମି.ଲି ମାଲାଥ୍ରିଅନ ୫୦% ଇ.ସି ବା ୧ ମି.ଲି ଡାଇକ୍ଲୋରଡସ୍ ୭୬%
ଇ.ସି. କାର୍ବୋରିଲ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି ଲିଟର ପ୍ରତି ୩ ଗ୍ରାମ୍ ବା ଫେନିଟ୍ରୋଥ୍ରିଅନ୍
୫୦% ଇ.ସି ୨ ରୁ ୨.୫ ମି.ଲି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମହିଷା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ :

ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ହୋକ୍ସାକୋନାଜଲ (Bean) ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ + ମାର୍କୋଜେବ୍ (Merzer) ବା ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଆଇପ୍ରୋଡିଅନ୍ + କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା ୧ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ + ମାର୍କୋଜେବ୍ (companion) ବା ୧ ମି.ଲି ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ୍ ବା ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୟୋଫାନେଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ ବା ଅରିଓଫ୍‌ଝିନ୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ବା ଆଇସୋପ୍ରୋଥାଇଲେନ୍ ୧.୫ ମି.ଲି ବା ୧ ମି.ଲି ଇପ୍ରୋବେନଫସ୍ ବା ଏଡିଫେନ୍‌ଫସ୍ ବା ୨ ରୁ ୨.୫ ମି.ଲି କାସ୍ତୁରୀମାଇସିନ୍ ବା ୧.୫ ମି.ଲି ଆଇସୋପ୍ରୋଥାଇଲେନ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଛାଦ ପୋଡା ରୋଗ / ପତ୍ରଛାଦ ସଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ :

ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ହୋକ୍ସାକୋନାଜଲ + ଜିନେବ୍ (ଅବତାର) ବା ଇପ୍ରୋବେନଫସ୍ ୧ ମି.ଲି ବା ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୟୋଫାନେଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ବା ୨ ମି.ଲି ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ବା ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଆଇପ୍ରୋଡିଅନ୍ + କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା ୧ ମି.ଲି. ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୧। ୧ ମି.ଲି. ଏଡିଫେନ୍‌ଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୂଳ ସଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ :

ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି ଏଡିଫେନ୍‌ଫସ୍ ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ + ଜିନେବ୍ ବା ୨ ମି.ଲି. ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସାଆରା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ :

ଧାନ ଥୋଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ କପର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଜିନେବ୍ ବା ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୟୋଫାନେଟ୍ ମିଥାଇଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗ :

ଆକ୍ରାନ୍ତ କିଆରିରେ କିଆରିରେ ୨ ରୁ ୩ ଥର ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ଷ୍ଟେପଟୋମାଇସିନ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

କଥାରେ ଅଛି :

“ଧାନ ଖାଲି ଦାନା ନୁହେଁ, ସତେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି
ମାଟି ଖାଲି ମାଆ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମ ଭାରତୀ ।”



ଯୋଗାଯୋଗ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି, ରା. ଉତ୍ତରଗିରି
Email : kvkgajapati.ouat@gmail.com