

ଉତ୍କଳ ପ୍ରଶାଳରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ

ଅଧିକାରିକା ଚାଷ



ଡଃ ରଶ୍ମିତା ଟଣ୍ଡୋ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି
ପାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି



ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୦୩



ଉତ୍କଳ ପ୍ରଶାଳରେ

ଲଙ୍କା ତାଷ

ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଡଃ ରଶ୍ମିତା ଟଣ୍ଡୋ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି
ପାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ସମ୍ପାଦକ
ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ



ଉତ୍କଳ ପ୍ରଶାଳାରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଡଃ ରଶ୍ମିତା ଟଣ୍ଡୋ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି

ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ସମ୍ପାଦକ

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ମୁଦ୍ରଣ :

ମିଡିଆ ସଲ୍ୟୁସନ

ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମୋ - ୯୭୭୭୮୪୭୨୭୭

ଉତ୍କଳ ପ୍ରଶାଳାରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ

ଉପକ୍ରମ : ଲଙ୍କା ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ । ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୮.୯ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ନିୟୁଟ୍ ଟନ୍ ଲଙ୍କା ଅମଳ ହେଉଛି । ଲଙ୍କାକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ହିସାବରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ମେକ୍ସିକୋ, ନାଇଜେରିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀ, ସେନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ।

ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଲଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା ୪୩ ଭାଗ ଲଙ୍କା ଭାରତରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୮.୧୦ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରା ହେଉଛି ଓ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଲଙ୍କା ଅମଳ ହେଉଛି ।

ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରଜସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ । ସମଗ୍ର ଭାରତର ଶତକଡ଼ା ୫୮ ଭାଗ ଲଙ୍କା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ୭୫୭୨୩ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ।

ଉପାଦେୟତା :

ଲଙ୍କା ମରିଚ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ହଜମି ଅଟେ । ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଲମ ଦ୍ଵାରା ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ ଯଥା ଅଣ୍ଟାବିନ୍ଧା, ଆଣ୍ଟୁଗଣ୍ଠି ବାତ, ଆଦି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ । ଏହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଔଷଧ, ଟନିକ୍ ଚର୍ମ ଅବଶ୍ୟମେଷ୍ଟ ଏବଂ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଧନର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଓ ଅମ୍ଳପିତ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଲଙ୍କା ମରିଚକୁ ସବୁଜ କିମ୍ବା ପାଚି ଯିବାପରେ ଶୁଖାଇ ଏକ ମସଲା ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆଚାର, କେଚପ, ସସ୍, ପେଷ୍ଟ, ଚଟନି ଆଦି ମୁଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଲଙ୍କା ମରିଚରେ କାର୍ବୋକ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏକ ଉଦ୍‌ବାୟୀ କ୍ଷାର ଥାଏ ଯାହା ରାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ (କ), (ଖ) ଓ (ଗ) ଥାଏ ।

୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ

	ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା	କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା
୧. ଜଳ	୧୦ ଗ୍ରାମ	୮୫.୭ ଗ୍ରାମ
୨. ପୁଷିସାର	୧୫ ଗ୍ରାମ	୨.୯ ଗ୍ରାମ
୩. ଚର୍ବି	୬.୨ ଗ୍ରାମ	୦.୬ ଗ୍ରାମ
୪. ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ	୬.୧ ଗ୍ରାମ	୧.୦ ଗ୍ରାମ
୫. ଚନ୍ଦ୍ର	୩୦.୨ ଗ୍ରାମ	୬.୮ ଗ୍ରାମ
୬. ଶ୍ୱେତସାର	୩୧.୬ ଗ୍ରାମ	୩.୦ ଗ୍ରାମ
୭. ଫସ୍‌ଫେଟ୍	୩୭୦.୦ ଗ୍ରାମ	୮୦.୦ ଗ୍ରାମ
୮. ଚୁନ	୧୬୦ ମି.ଗ୍ରା	୩୦.୦ ମି.ଗ୍ରା
୯. କାରୋଟିନ୍	୩୪୫.୦ ମି.ଗ୍ରା	୧୭୫ ମି.ଗ୍ରା
୧୦. ଭିଟାମିନ୍ (ଗ)	୫୦୦ ମି.ଗ୍ରା	୧୧୧.୦ ମି.ଗ୍ରା
୧୨. ଥାୟୋମିନ୍	୦.୯୩ ମି.ଗ୍ରା	୦.୧୨ ମି.ଗ୍ରା
୧୩. ରିବୋଫ୍ଲାଭିନ	୦.୪୩ ମି.ଗ୍ରା.	୦.୩୯ ମି.ଗ୍ରା
୧୪. ଶକ୍ତି (କ୍ୟାଲୋରୀ ମୂଲ୍ୟ)	୨୯୭	୨୨୯

ମୃତ୍ତିକା :

ହାଲୁକା, ଦୋରସା ଚୂନ ସମୃଦ୍ଧ, ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ, ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ଲଙ୍କା ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ଥରୁ ୭ ଥିଲେ ଲଙ୍କା ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଗଛ ମରିଯାଏ। ହାଲୁକା ମାଟି ଲଙ୍କା ମରିଚର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

ଜଳବାୟୁ :

ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଲଙ୍କା ଭଲ ଫଳିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରପତନ ୦ରୁ ୨୦୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ୨୦-୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲଙ୍କା ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍, ଖରାଦିନେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି, ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ଫରାଗସଙ୍ଗମ ଏବଂ ଫଳ ଧରିବା କମିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଳ କମିଯାଏ। ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ୭୫ ରୁ ୧୦୦ ଇଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଙ୍କାକୁ ବୃଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ ଫସଲ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ।

ଗଛର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉଦ୍‌ଦିପାତ କରେ, ୨୧ ରୁ ୨୪ ଭାଗ ଅମଳ ବଜାଏ ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ବର୍ଷାଦିନେ ନିପାଣିଆ ଫସଲ ରୂପେ ଓ ରବି ରତ୍ନରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

କିସମ : ଲଙ୍କା କିସମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି :

(କ) ମୁକ୍ତ ପରାଗ ସଂଗମ କିସମ (ଖ) ସଙ୍କର କିସମ

ମୁକ୍ତ ପରାଗ ସଂଗମ କିସମ : ୧. ପୁଷ୍ପା ଜ୍ୱାଳା : ଏହି କିସମ ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଙ୍ଗାରା ଏବଂ ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇଥାଏ । ଫଳ, ଲମ୍ବା, ପତଳା, ବଙ୍କାଳିଆ ଓ ଲହୁଣୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସାଲାତ ଓ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।

୨. ପକ୍ତ ସି-୧ : ଗଛ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସିଧା, ଫଳର ଉପର ଅଂଶ ମଣ୍ଡଣ, ଅଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ । ଏହା ବହୁତ ରାଗ ଏବଂ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ଭୂତାଣୁଜନିତ (ମୋଜାଇକ) ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ କିସମ । ୩. ପକ୍ତ ସି-୨ : ଫଳଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଓହଳିଥାଏ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ଓ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ । ୪.

ଆର୍କା ଲୋହିତ : ଫଳ ଘନ ସବୁଜ, ସିଧା, ପାକଳ ହେଲେ ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ରାଗ, ଏହା ଶୁଖିଲା ଓ କଞ୍ଚା ଉଭୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇପାରେ । ୫. କେଏ-୨

: ଗଛ ବାଙ୍ଗାରା, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ୬. ପୁଷ୍ପା ସଦାବହାର : ଗଛ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଉଚ୍ଚ, ଫଳ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସବୁ ରତ୍ନରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ୭. ଉତ୍କଳ ଆଭା : ଏହି କିସମର ଗଛ ଡେଙ୍ଗା

ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଏହା ଉଭୟ କଞ୍ଚା ଓ ଶୁଖିଲା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ୮.

ଉତ୍କଳ ରଶ୍ମି : ଏହା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ । ଏହା ୧୨୫-୧୩୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଉତ୍କଳ ରାଗିଣୀ କିସମଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ୧୨୦-୧୩୦ ଦିନର ଓ ମାତ୍ରାଧିକ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ସଙ୍କର କିସମ : ଏହି କିସମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ । ଏହି କିସମର ଚାଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିରେ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଜ୍ୟୋତି, ତେଜସ୍ବିନୀ, ଅଗ୍ନିରେଖା, ରୋଷ୍ଟି ଅଗ୍ନିବାଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରେତସ୍କାର, ଇଣ୍ଡମ-୫, ଇଣ୍ଡମ-୬ ଇତ୍ୟାଦି ।

ମଞ୍ଜିର ପରିମାଣ : ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ସଙ୍କର ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୫୦ରୁ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ବିହନ ଓ ବଂଶବିଷ୍ଣୁର :

ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଦ୍ଵାରା ବଂଶ ବିଷ୍ଣୁର କରିଥାଏ । ଏହାର ମଞ୍ଜିରୁ ତଳିଘରାରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ । ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୬୦୦ରୁ ୭୫୦ ଗ୍ରାମ ବିହନ କିମ୍ବା ୬୨,୦୦୦ରୁ ୬୫,୦୦୦ ତଳି ବା ଚାରା ଆବଶ୍ୟକ । ସଙ୍କର କିମ୍ବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ସହିତ ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା ୧୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁଥିବା ଉଚ୍ଚାୟାନ ଆବଶ୍ୟକ । ୧ ମିଟର ଓସାର, ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ୫ ରୁ ୭ ମିଟର ଲମ୍ବର ତଳି ପଟାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଟିଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯାଏ । ଏକ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ୭୦-୮୦ ବର୍ଗମିଟର ତଳି କିଆରୀ ଆବଶ୍ୟକ । ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ତଳି କିଆରି ପାଇଁ ୨ ରୁ ୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ଖତ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଖରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ହାରହାରି ବର୍ଗମିଟର ତଳିପଟାଳୀ ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ ଏନ୍.ପି.କେ ସାର (୧୫:୧୫:୧୫) ଏବଂ ଏକଗ୍ରାମ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ଦାନଦାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହାପରେ ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଆର କରି ଅଗଭାର ଭାବରେ ବିଶୋଧିତ ମଞ୍ଜିକୁ ପତଳା କରି ବୁଣି ତା ଉପରେ ହାଲୁକା ମାଟି ଘୋଡାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହା ଉପରେ ନଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ଛାଦିକରଣ କରି ଜଳସିଞ୍ଚନ କଲେ ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରେ । ନଡ଼ାକୁ ବାହାର କରି (୦.୫%) ଯୁରିଆ ସହ ୦.୨% ମାନକୋଜେବ୍ ମିଶାଇ ପତ୍ତରେ ସ୍ତେ କଲେ ଚାରା ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ । ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନର ଚାରାଗୁଡ଼ିକର ତେରକୁ ୧ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋସଲଫାନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଦବୁଣ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡାଇ ପରେ ରୋପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପୋକ ଏବଂ ସୂତ୍ରଜୀବ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବର୍ଷାଋତୁରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଶୀତଋତୁ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ତଳି ରୋଇବାର ୪-

୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ସଶକ୍ତ ହୋଇ
ମାଟିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ରୋପଣ:-

ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଭୀର ଚାଷ କରିବା ପରେ ୩ ରୁ ୪ ଅର ହଳ କରି ଗୁଣ୍ଡ
କରାଯାଏ । ମାଟିରେ ସିଆର କରି ସେହି ସିଆରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖତ ମିଶାଇ
ଦିଆଯାଏ । ବର୍ଷାଦିନେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ
ଦେଇ ଜମି ସମତୁଲ ନଥିଲେ ହିତ କରି ଛୋଟ ପଟାଳି କରି ହୁଡ଼ାରେ ଗଛ
ଲଗାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଧାତିକୁ ଧାତି ୫୦-୬୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଗଛକୁ ଗଛ
୩୦-୪୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଗଛ ଲଗାଯାଏ । ଏହି ହିସାବରେ ଡେଙ୍ଗା କିସମ
ଲଙ୍କା ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗେଡ଼ା ଗଛକୁ କମ୍ ଦୂରତା ଲଗାଯାଏ ।
ବର୍ଷାରତ୍ନର ଫସଲ ପାଇଁ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଶୀତରତ୍ନରେ ଫସଲ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର
ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଚାରା ରୋପଣ
କରିବା ଉଚିତ୍ । ତଳି ଲଗାଇବାର ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପରେ ମରିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ
ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ
ମଞ୍ଜି ବୁଣି ୩୦ରୁ ୩୫ ଦିନର ତଳି ଜମିରେ ଲଗାଇଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ :

ସାଧାରଣତଃ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ ରୁ ୨୫ ଟନ୍ ଗୋବରଖତ, ୭୫
କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଫସଫରସ ଓ ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ୍
ପଟାସ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୬୩
କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ ୩୧୨ କି.ଗ୍ରା ସିଙ୍ଗଲସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଓ ୧୨୫ କି.ଗ୍ରା
ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ ଦରାକର ହୋଇଥାଏ । ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସିଆରରେ
ସମସ୍ତ ଖତ ସହି ୧୫ କି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ (୩୨ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ), ସମସ୍ତ ଫସଫରସ
(୩୧୨ କି.ଗ୍ରା) ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପଟାସ୍ ସାର (୬୨ କି.ଗ୍ରା) ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ
ମିଶାଇବା ପରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଗଛ ଲଗାଇବାର ୨୫ ଦିନ ପରେ କୋଡ଼ାଖୁସା
କରି ୩୦ କି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ (୬୫ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ) ସାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକି
ଦିଆଯାଏ । ତଳି ଲଗାଇବାର ୪୫ ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଥର କୋଡ଼ାଖୁସା କରି
ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦ କି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ (୬୫ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ) ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଟାସ୍ ସାର
(୬୩ କି.ଗ୍ରା) ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଆଯାଏ । ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଅଭାବ
ଦେଖାଦେଲେ ଗଛ ଗେଡ଼ା ହୋଇ ରହେ । ପତ୍ରର ସବୁଜିମା କମିଯାଏ, ପୁରୁଣା ପତ୍ର

ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଫସଫରସ୍ ସାର ଅଭାବରେ ପତ୍ର ଛୋଟ ହୋଇ ବାଲଗଣୀ, ସବୁଜ ବଲଗଣୀ, ଜଷ୍ଟ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇ ପରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ । ପତ୍ର ସ୍ୱ ସାର ଅଭାବରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜାକିକୁଳି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳାଦାଗ ଦେଖାଯାଏ । ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରକୁ ୩ ରୁ ୪ ଭାଗ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରର ୪ ଭାଗରୁ ୩ ଭାଗ ରାସାୟନିକ ସାର ହିସାବରେ ଏବଂ ୧ ଭାଗ ଜିଆ ଖତ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଗଛ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଶ୍ରିତ ଅଣୁସାର ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଜଳସେଚନ : ଚାରା ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପରେ ସିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ । ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ୪-୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଫୁଲ ଓ କଷି ଝଡ଼ିପଡ଼େ । ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ଉଚିତ୍ । ମାଟି ଉପରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ନଡ଼ା ବା ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାଦିକରଣ କରିଲେ ମାଟିର ବତର ରହିବା ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଯିବ । ଅଏତବ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ନଚେତ୍ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗଛ ଶୁଖିବା ଓ ହଠାତ୍ ମାତ୍ରାଧିକ ଜଳସେଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ି କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ଫାଟିଯାଏ । ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅଣୁ ଜଳସେଚନ ଯେପରିକି ସିଞ୍ଚନ ବୁନ୍ଦା ଓ ପୁଷ୍ଟି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁଛି ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ : ଦୁଇରୁ ତିନିଥର ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ବାଛି କୋଡ଼ା ଖୁସା କରି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦେଲେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ସହ ଗଛ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ବଢେ ।

ଗଛ ଲଗାଇବାର ୨୫ ଦିନ ପରେ ରାସାୟନିକ ତୃଣନାଶକ ଭାବରେ କୁଇଜଲପପଇଥାଇଲି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ଘାସ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହ ୨୦ ଦିନ ପରେ ଥରେ ହାତରେ ଘାସ ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ୫୦ ପିପିଏମ୍ ନାପଥାଲିନ୍ ଏସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍ (ଏନ୍.ଏ.ଏ) କିମ୍ବା ୪୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍ ଇଥ୍ରେଲ୍ ଗଛରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

ରୋଗ ପରିଚାଳନା :

ଲଙ୍କା ଗଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଝାଉଁଳା, ଫଳସଜା, ଅଗମରା, ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ।

ଝାଉଁଳା ରୋଗ :

(କ) କବକ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ : - ଏହି ରୋଗ ଏକ ମୃତ୍ତିକାବାହୀ କବକ ଜନିତ ରୋଗ । ଗଛର ତଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ବା ଫିକା ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଉପର ଆଡକୁ କ୍ରମାଗତ ମାଡେ । ମାଟିର ଠିକ୍ ଉପର ଅଂଶରେ ଥିବା ଗଛର କାଣ୍ଡ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେହି ଅଂଶର କାଣ୍ଡର ଚୋପା ସଜିଯାଏ ଏବଂ କାଣ୍ଡଟି ସବୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପତାଗନ୍ଧ ବାହାରେ । ଗଛ ଓପାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମୂଳ ଅଂଶରେ ଧଳା ଧଳା ସୂତା ପରି କବକ ଜାଲ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ସୋରିଷ ଦାନା ପରି ଫିମ୍ପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କମ୍ ଉଷ୍ମତା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ମାଟି ସଜସଜିଆ ରହିଲେ ଏହି ଫିମ୍ପି ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ବେଶୀ ବ୍ୟାପେ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଗଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝାଉଁଳି ପ୍ରାୟ ୫-୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଡୋମାଇସିନ୍ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟାଲିକ୍ସ୍ ଓ ମାନକୋଜେବ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

(ଖ) ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ : - ଏହା ଏକ ମୃତ୍ତିକାବାହୀ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ । ଖରିଫ ଋତୁରେ ନାଲି ଓ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ମାଟିରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ରହିଥାଏ । ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନରେ ଝାଉଁଳି ପତ୍ରଟି ରାତିରେ ପୁଣି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି । ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଝାଉଁଳି ମରିଯାଆନ୍ତି । ଅକ୍ଷାତ ଗଛର ମାଟି ଉପର କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ଉପର ଚୋପା ସାମାନ୍ୟ କଳା ପଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ମୂଳ ପାଖର କାଣ୍ଡ ଚିରିଦେଲେ ଭିତର ଶସ ଅଂଶ କଳା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜୀବାଣୁ ଶ୍ରାବ ବାହାରେ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରି କିସମ ଯଥା ଉତ୍କଳ ଆଭା ଓ ଉତ୍କଳ ରଶ୍ମି ଲଗାଇବା ସହିତ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟେପୋସାଇକ୍ଲିନ୍ (୨୫ ପିପିଏମ୍) ୨.୫ ମିଲି/ଗ୍ରା ଲିଟର ପ୍ରତି ଦ୍ରବଣରେ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

(ଗ) ସୂତ୍ରଜୀବ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ : - ଏହି ପ୍ରକାରର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସୂତ୍ରଜୀବ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଗେଡା ହୋଇଯାଏ । ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ

ଚେରରେ ଲୋମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ ଲୋମ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ମଧ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଫଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି, ଶୁଖି ଝାଉଁଳି ମରିଯାଆନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚେରର କ୍ଷତ ଦେଇ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଗଛ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଗଛ, ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିଆସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଓ ମୃତ୍ତିକା ବିଶୋଧନ କରିବା ସହିତ କରଞ୍ଜ ଓ ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ଜଳନିଷ୍କାସନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଜଉପୋକ : ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଏହି ପୋକ ପରମ ଶତ୍ରୁ । ଯାହାକି ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଡେମ୍ଫରୁ ରସ ଶୋଷି ନିଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚାରା ଲଗାଇବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମିଡା କ୍ଲୋପିଡ୍ ୧୨୦ ମି.ଲି. ଅଥବା ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।



ଅଷ୍ଟପଦୀ ପୋକ : ଏହି ପୋକ ପତ୍ରର କୋଷରୁ ରସ ଶୋଷିପକାଏ ତଥା ଗଛକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଭୂତାଣୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡାଇକୋଫଲକୁ ୨.୫ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର କିମ୍ବା ସଲଫର ୫୦ ଡବ୍ଲୁପି ୨ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ : ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯାହାକି ଉକୁଣୀ ଓ ଅଷ୍ଟପଦୀ ପୋକଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଗଛ ସବୁ ହୋଇଥାଏ ରୋଗର ତୀବ୍ରତା ବେଶୀ ହେଲେ ଗଛ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧରିବା ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ । ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ଗଛକୁ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକି ହୁଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଉକୁଣୀ ଓ ଅଷ୍ଟପଦୀକୁ ଦମନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଫଳସତ୍ତା : ଫଳ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାଦାଗ ଧିରେ ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗୋଲ ଆକାର ଧାରଣ କରେ ଓ ଅପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ତଥା ଅମଳ

ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ରୋଗର ତୀବ୍ରତା ବେଶୀ ହେଲେ ଗଛ ଅଗଆଡୁ ତଳ ଆଡକୁ ଶୁଖିଥାଏ । ଏହି ରୋଗକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତଳି କିଆରୀରେ ୨-୩ ଥର ବ୍ଲାଜଟକୁ ୫୦ କିମି ବାଉଷିନ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ମୂଳସଜ୍ଜା : ଏହି ରୋଗ ତଳି କିଆରୀରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ ସଜ୍ଜିଯାଏ ତଥା ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଗଲେ ଉଚ୍ଚ କିଆରୀରେ ମଞ୍ଜି




ବୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ରୋଗକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ୧-୨ ଥର ବ୍ଲାଜଟକୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତଳି କିଆରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଆପସ : ଏହି ପୋକ ପତ୍ର ତଳ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ରସ ଶୋଷି ଖାଇଯାଏ । ପତ୍ର ମୋଡି ହୋଇ ଧଳାମିଶା ହଳଦିଆ ପଡିଯାଏ, ପରେ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୫-୩୦% ଅମଳ କମିଯାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚାରା ଲଗାଇବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମିଡା କ୍ଲୋପିଡ୍ ୧୨୦ ମି.ଲି. ଅଥବା ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଗମରା ଓ ଆକ୍ରାଙ୍କୋକ ରୋଗ : ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଗଛର ତାଳ ଝାଉଁଳି ଶୁଖିଯାଏ । ତାଳରେ ଓ ଫଳରେ କଳାପତା ଦାଗ ଉପରେ ଗୋଲାପି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପଡିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଓ ଗଛ ଥୁଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବିଶୋଧନ ସହିତ ୨-୩ ଥର ବ୍ଲାଜଟକୁ ୫୦ କିମି ବାଉଷିନ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।



ଧଳାମାଛି : ଧଳାମାଛି ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ତେଜହୀନ ହେବା ସହିତ ପତ୍ରମୋଟା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଫୁଲ ଫଳ ଝଡିପଡେ । ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ମିଲିମିଟର ମିଥାଇଲ୍ ଡିମିଟେନ୍‌କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଜମିଡୋକ୍ଲୋପିଡ୍ ୧୭.୮



ଏସଏଲ ୫୦ ମି.ଲି. ସହ କାର୍ବୋକ୍ସାଜିମ୍ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ଗଛ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳକୁ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅମଳ : ଚାଚା ଲଗାଇବାର ୪୫ ରୁ ୬୦ ଦିନ ପରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ । ଏହାର ମାସକ ପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଫଳ ପାକଳ ହେଲେ ୬ ରୁ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ । ପାଟିଲା ଲଙ୍କା ଚାଚା ରୋପଣର ୧୨୦ ଦିନ ପରଠାରୁ ପାଟିଲା ଲାଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମଳ କରାଯାଏ । ହେକ୍ଟର ପିଛା ୭୫ ରୁ ୧୦୦ କିଣ୍ଟାଲ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ୨୦ ରୁ ୨୫ କିଣ୍ଟାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଲଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଚାଷରୁ ଶତକଡ଼ା ୪୦ ରୁ ୫୦ ଭାଗ କମ୍ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ

ବିହନ ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି କିସମ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ ମିଟର ବିଲଗନ ଦୂରତା ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଭଲଭାବେ ପାଚିଥିବା ଓ ଶୁଖୁଥିବା ଲଙ୍କାରୁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରୁ ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ମଞ୍ଜି ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦-୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ୧ ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ୫୦୦ରୁ ୫୫୦ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ମିଳିଥାଏ । ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲଭାବେ ଶୁଖାଇ କି.ଗ୍ରା ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ ଗୋଲାଜ ସାଇତି ରଖିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ସାଇତି ରଖିହେବ ।

ଅତଏବ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇପାରିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ଆଶାନୁରୂପକ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ।





ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ : ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମରୁରୁ (ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ)
 ଯୋଗାଯୋଗ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି - ୭୬୧୦୧୭
 Email : kvkgajapati.ouat@gmail.com