

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୋରିଷ ଚାଷ



ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରଶାସ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୦୩



ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ରୋରିଷ ଚାଷ

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ. ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୋରିଷ ଚାଷ

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ସମ୍ପାଦକ

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ମୁଦ୍ରଣ :

ମିଡିଆ ସଲ୍ୟୁସନ

ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମୋ - ୯୭୭୭୮୪୭୨୭୭

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୋରିଷ ଚାଷ

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳବାଜ ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ଚିନାବାଦାମ ପରେ ସୋରିଷର ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ । ଆମରାଜ୍ୟରେ ଏହା ୧,୧୬,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇ ବାର୍ଷିକ ୨୩,୦୦୦ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ବାର୍ଷିକ ୩୩,୦୦୦ ଟନ୍ ସୋରିଷ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ । ଏପରିକି ପ୍ରାକ୍ ରବି ଓ ରବି ରତ୍ନରେ ଏହା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଭାବ ହେତୁ ସୋରିଷ ଫସଲରେ ୩୦ ରୁ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଣୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲେ ଏହି ଫସଲରୁ ଆଶାନ୍ୱରୁପକ ଅମଳ ମିଳିବା ସହିତ ଖାଇବା ତେଲରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବତା ହୋଇପାରିବ ।

ମୃତ୍ତିକା :

ସୋରିଷ ଫସଲ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଗିଡ଼ା ଢିପ ମଝିଆଳ କିସମ ଦୋରସା ପଚୁମାଟି ଏପରିକି ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଉପଯୁକ୍ତ ।

ବିହନ :

ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି : ଏମ୍-୨୭ (୭୫ ଦିନ), ପି.ଟି ୫୦୭ (୭୫ ଦିନ), ଟି-୯ (୮୫ ଦିନ), ପି.ଟି-୩୦୩ (୮୦ ଦିନ), ଅନୁରାଧା (୭୦ରୁ ୭୫ ଦିନ), ପାର୍ବତୀ (୬୫ ଦିନ) ।

ଜଳସେଚିତ ଜମି : ପି.ଟି.-୩୦୩ (୮୦ ଦିନ), ବିନୟ (୯୦ ଦିନ), ପୁଷା ବାହାର (୧୦୦ ଦିନ), ପୁଷା ବୋଲଡ (୧୦୫ ଦିନ), ପି.ଟି.-୫୦୭ (୭୫ ଦିନ) ।

ବୁଣିବା ସମୟ :

ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମାଟିର ବତରକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଜମିରେ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣାଯାଇଥାଏ ।

ବିହନ ପରିମାଣ ଓ ବିଶୋଧନ :

ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ କିସମ ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩-୪ କି.ଗ୍ରା ବିହନ ଦରକାର ହୁଏ । ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ୧ କେ.ଜି. ବିହନ ପିଛା ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିନ୍ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିହନ ବୁଣା :

ଜମିକୁ ୩/୪ ଓଡ଼ ଗୁଣ୍ଠ ଚାଷ କରି ଲଙ୍ଗଲ ସିଆର ପଛରେ ବା ଧାଡ଼ି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ.ମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୮-୧୦ ସେ.ମି ଦୂରତାରେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ । ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ୧୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନିଆ ବିହନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୪୫ ସେ.ମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ।

ଖତ ଓ ସାର :

ଏକର ପ୍ରତି ୨ଟନ୍ ସବ୍ଫା ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହି ଅଣଜଳସେଚିତ ସୋରିଷ ଫସଲ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ କି.ଗ୍ରା

ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୬ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ୩ ୬ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ୩ ଜଳସେଚିତ
ଫସଲ ପାଇଁ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ୩ ୧୨
କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଫସଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତ
ସାର ବିହନ ବୁଣାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଳସେଚିତ
ଫସଲ ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଫସଫରସ୍, ସମସ୍ତ ପଟାସ୍ ୩
ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଅଧା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବାକି ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ
ଗଛ ଉଠିବାର ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଧାଡ଼ି ମଝିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୋଡ଼ା ଖୁସା
କରନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ତଃଗାମ :

ଗଛ ଉଠିବାର ୧୫-୨୦ ଦିନ ପରେ ଧାଡ଼ିରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ
ଦେଖାଦେଲେ ୮-୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଦୁର୍ବଳ, ରୋଗୀଣା,
ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ପତଳା କରନ୍ତୁ ୩ ୨୦-୨୫ ଦିନ ବେଳକୁ
କୋଡ଼ା ଖୁସା କରି ଅନାବନା ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଜଳସେଚନ :

ସୋରିଷ ମୋଟ ୩୦୦ ମିଲିମିଟର ପାଣି ଦରକାର କରିଥାଏ । ଚାବା,
ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ୩ ଫଳବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ୩ଥର ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ

(୧) ଜଉପୋକ :

ଉଭୟ ଅର୍ଦ୍ଧକ ୩ ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ପୋକ ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଛୁଇଁରୁ ରସ
ଶୋଷଣ କରନ୍ତି । ପତ୍ର, ବଢ଼ିଲା ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଫଳରେ ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହୋଇ
ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଗଛ ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି

୪୦୦ ମି.ଲି. ମିଥାଇଲ୍ ଡିମେଟନ୍/ ଡାଇମିଥୋଏର୍ / କୁଇନାଲିନ୍ କିମ୍ବା
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୫୦ ମି.ଲି.କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

(୨) କରଟିଆ ମାଛି :

ଏହା ସୋରିଷର ପତ୍ର ଓ କଅଁଳିଆ ଅଂଶ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି ।
ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ମି.ଲି. ନିୟତାତ କୀଟନାଶକ
୦.୧୫% କିମ୍ବା ୫୦୦ ମି.ଲି. ଫୋସାଲୋନ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ ଯୋକ
ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ।

(୩) ସବୁଜ ପତ୍ରଖୁଆ ଯୋକ :

ଶୁକ୍ଳଗୁଡିକ ପତ୍ର ଓ ଅଗରେ ଥିବା ଫୁଲକୁ ବାନ୍ଧିଦେଇ ତା' ମଧ୍ୟରେ
ରହି ପତ୍ର, କଢ଼ ଓ ଫଳ ଖାଇଯାନ୍ତି । ଅଧିକ ହେଲେ ଗଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ
ପତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ଝାଡୁ ଭଳି ଗଛ ଠିଆ ହୋଇ ରହେ ।
ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. ଇଥୋଫେନ୍‌ପ୍ରକ୍ କିମ୍ବା
ଇଣ୍ଡକ୍ସାକାର୍ବକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

(୪) ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ :

ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ତଳପାଖେ ପାଣି ପଡ଼ା ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ।
ଏହାର ୪ ଧାର ବାଦାମୀ ଓ ମଝି ଅଂଶ ଧୂସର ଦେଖାଯାଏ । ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲେ
ଯୋଡ଼ାଳିଆ ଏବଂ ଦେଉଳୀ ହୋଇ ଶୁଖିଯାଏ । ଏହି ଚିହ୍ନ ଫଳ ଉପରେ
ଦେଖାଦେଲେ ଫଳ ପାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଯାଏ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର
ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମାନକୋଜେବ୍‌କୁ
୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

(୫) ତଳୋଦ୍ଗୁଣୀ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ :

ପତ୍ରର ତଳ ପାଖରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯାଇ ପାଉଁଶିଆ ଦେଖାଯାଏ । ପରେ ପତ୍ର ଶୁଖି ସହଜରେ ଗଛରୁ ଝଟିପଡ଼େ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା. କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍‌କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅମଳ :

ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲେ, ସକାଳ ବେଳା ବା ଅଷ୍ଟା ସମୟରେ ଅମଳ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅମଳ ପରେ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ବାଡ଼ିରେ ବାଡେ କିମ୍ବା ବଳଦ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ରଗଡ଼ି ସଫା କରି ସାଇତି କରି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଖରାରେ ଶୁଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଅମଳ କରି ବିଳମ୍ବରେ ସାଇତି ରଖିଲେ ଏଥିରୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଅତଏବ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ ୩ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଜମିରୁ ୫ କ୍ୟୁଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ସୋରିଷ ଚାଷରେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ :

୧. ସୋରିଷ ଚାଷରେ ସହଜ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବୁଣା ବୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
୨. ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
୩. ଅନାବନା ତଥା ବିକଳ ପୋଷକ ଗଛ ଓ ଲଟା ଆଦି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ପରିଷ୍କାର ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।

୪. ରୋଗ ପୋକ ସହଣି ତଥା ଛୁଇଁ ଫାଟୁ ନଥିବା କିସମ ଚାଷ କରନ୍ତୁ।
ସଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ବୁଣିବା ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରତି ବିଶେଷ
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
୫. ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଜଳସେଚନ ସହିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ
ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଫୁଲ ଧରିବା ସହିତ ଛୁଇଁ ଆସି ଅମଳ
ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ।
୬. ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଉପକାରୀ କୀଟ ସହିତ ମହୁ ମାଛି ବାକ୍ସ
ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ।
୭. ପରାଶ୍ରୟୀ କିମ୍ବା ପରଜୀବୀ କୀଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲରେ କୀଟ
ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ।
୮. ଜଉ ପୋକ ଓ ଶୋଷକ କୀଟର ପାଦୁଜାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଜ
ବୁଣିବା ସହିତ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ରାସାୟନିକ
କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
୯. ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅମଳ କରିବା ସହିତ ସାଇତି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରନ୍ତୁ।
୧୦. ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଜୈବିକ ଓ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ
କରନ୍ତୁ।



ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ : ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ (ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ)

ଯୋଗାଯୋଗ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି - ୭୬୧୦୧୭

Email : kvkgajapati.ouat@gmail.com