

କଦଳୀ ଉତ୍ପର ବୈଷୟିକ ଦିଗ



ଡଃ ରଶ୍ମିତା ଟଣ୍ଡୋ
ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି
ପାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୦୩



କଦଳୀ ଚାଷର ବୈଷୟିକ ଦିଗ

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଡଃ ରଶ୍ମିତା ଟଣ୍ଡୋ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି

ପାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ସମ୍ପାଦକ

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



କଦଳୀ ଚାଷର ବୈଷୟିକ ଦିଗ

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଡଃ ରଶ୍ମିତା ଟଣ୍ଡୋ

ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି

ପାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ସମ୍ପାଦକ

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ମୁଦ୍ରଣ :

ମିଡିଆ ସଲ୍ୟୁସନ

ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମୋ - ୯୭୭୬୮୪୭୨୭୬

କଦଳୀ ଚାଷର ବୈଷୟିକ ଦିଗ

କଦଳୀକୁ ଗରାବ ଲୋକଙ୍କ ପଳ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଶସ୍ତା ଓ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଥାଏ । କଦଳୀରେ ଲୌହ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିଅମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଥିବାରୁ ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । କଞ୍ଚା ଓ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର ଛଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ସେଥିରୁ ଜାମ୍, ବିଷ୍କୁଟ୍, ଚିପ୍ସ, ମଣ୍ଡ, ଆଇସକ୍ରିମ୍, ମୃଦୁ୍ୟପାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ । କଦଳୀ ଗଛର କାଣ୍ଡକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସେଥିରୁ ଚିପ୍ସ ପେପର, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ : ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥଯୁକ୍ତ ଦୋରସା, ନିଗିଡ଼ା, ଗଭୀର ମାଟି କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ । ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ୫.୫ରୁ ୭.୦ ଥିବା ଜରୁରୀ । କଦଳୀର ଚେର ଗଛ ମୂଳରୁ ଦୁଇ ଫୁଟ ଭିତରେ ରହେ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ତିନି ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ମାଟି ଥାଏ, ସେଠାରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ । ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ୧,୨୦୦ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ, ହାରାହାରି ଉତ୍ତାପ ୨୦ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଓ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୨୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ ।

କିସମ : ତେଜା କିସମ - ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା, ବଡ଼ଲ, ବଡ଼ିସା । ବାମନ କିସମ - ରୋବଣ୍ଡା, କାବୁଲି । ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପାଚିଲା କଦଳୀ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏହି କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା ଇତ୍ୟାଦି । ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବାମନ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୋବଣ୍ଡା, ଡ୍ଵାର୍ଫ କାଭେଷ୍ଟିସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଆସୁଛି । ପରିବା ଶ୍ରେଣୀ କଦଳୀର କିସମ ହେଲା ବଡ଼ଲ ଓ ବଡ଼ିସା । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ତେଜା ହୋଇଥାଏ । ପାଟକପୁରା କଦଳୀରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଚମ୍ପା, ରୋବଣ୍ଡା, କାବୁଲି, ଏଚ୍-୧ ଓ ଏଚ୍-୨ କଦଳୀ କିସମଗୁଡ଼ିରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଧରେନାହିଁ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିରୁମାଲାଇ, ବିରୁପାକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି କିସମର କଦଳୀ ନିପାଣିଆ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଏ ।

ଏପରିକି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ପେଶାପୋଷଣ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ଯୋଗୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦୃତ ଓ ପରିଚିତ ।

କ୍ର.ସଂ.	ପାରମ୍ପରିକ କଦଳୀ ପୃଥା	ପେଣାପୋଷଣ କଦଳୀ ପୃଥା
୧.	ପୃଥା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆକାରର ତଥା ସମବୟସ୍କ ହୋଇନଥାଏ।	ପୃଥାଗୁଡ଼ିକ ସମଆକାର ଓ ସମବୟସ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ନିୟମିତ ତଥା ଏକକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
୨.	ପୃଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ତଥା ବିକୃତ ହୋଇଥାଏ।	ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିବାରୁ ନାଗୋର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ପୃଥା ମିଳିଥାଏ।
୩.	ମୂଳପୃଥା ବା ମା' ପୃଥାର ଗୁଣାବଳୀ ଚିହ୍ନଟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବା ଗୁଣାବଳୀ ମିଳିନଥାଏ।	ମା' ପୃଥାର ଗୁଣାବଳୀ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଣାମୂଳ ଓ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ।
୪.	ଗାଞ୍ଜ ପକ୍ଷତ୍ୱ ଯଥା - ଜଳସେଚନ, ଶ୍ରମନିଯୋଜନ ଆଦି ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଓ ସମୟସାପେକ୍ଷ।	ଜଳସେଚନ, ଶ୍ରମନିଯୋଜନ ତଥା ଖାସ୍ୟସାର ଅନେକାଂଶରେ କମ୍। ଏଣୁ ଲାଭ ଅଧିକ।
୫.	ଫସଲର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ୧ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ।	ଫସଲର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ୮ ରୁ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିମାନ୍ତ।
୬.	ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଓ ଆଉ ଏକମୂଳି ଫସଲ ସମ୍ଭବ।	ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଗୋଟି ମୂଳିଫସଲ ସମ୍ଭବପର।
୭.	ଧଣିତା, ଚମୋଟା, ଲଙ୍କା, କୋକି ମୂଳା ଆଦି ଅନ୍ତଃଫସଲ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ।	ଗଛର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟମିତ ତଥା ଏକକାଳୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ତଥା ଲାଭଦାୟକ।
୮.	ପୃଥା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗୃହ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ଫଳନ ଦକ୍ଷତା, ଗୁଣାବଳୀ ତଥା ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅମଳ କମ୍ ଓ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କମ୍।	ପୃଥା ଗୁଡ଼ିକ ଫଳନ ସମସ୍ୟା ନଥାଏ। ଏପରିକି ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ।

ବଂଶ ବିସ୍ତାର : କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶିଳୀ ପୁଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଶିଳୀପୁଆ ଦେଖିବାକୁ ତଳଆଡୁ ମୋଟା ହୋଇ ଉପର ଆଡୁକୁ ସରୁ ହୋଇଥାଏ । ଚାରା ପାଇଁ ଏହି ପୁଆ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ପାଣିପୁଆ ମୂଳରୁ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ମୋଟେଇ ଏବଂ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ଚାରା ପାଇଁ ଏହି ପୁଆଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ପେଣିପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କଦଳୀ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି । ଏଥିରେ ଏକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଫଳ ଅମଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ନିଆଯାଇପାରେ । ଏଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳେ ଓ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ । (ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା - ୨ ରେ ଆଲୋଚିତ)

ପୁଆ ଲଗାଇବା ସମୟ : ଡେଙ୍ଗା ଗଛକୁ (ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା, ବଡ଼ଳ, ବଡ଼ିସା) ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ଏବଂ ବାମନ ଗଛକୁ (ରୋବଞ୍ଚା, କାବୁଲି) ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର-ଜାନୁଆରୀ ଲଗାଇବା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ବୟସ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ କାଞ୍ଚି ଆସେ । ପେଣିପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଦଳୀ ଚାରା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଲଗାଯାଇପାରିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷକୁ ତିନିଥରରେ ଦଫା ଦଫା କରି କଦଳୀ ପୁଆ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷସାରା କଦଳୀ ମିଳିବ । ପ୍ରଥମ ଦଫା ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶୀ ପୁଆ ଲଗାଇବେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଫା ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓ ତୃତୀୟ ଦଫା ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ । କାବୁଲି ଓ ରୋବଞ୍ଚା କିସମ କଦଳୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦଫାରେ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ହୁଏ ଓ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ମିଳେ ।

ଲଗାଇବା ଦୂରତା : କାବୁଲି ଓ ରୋବଞ୍ଚା କିସମ ପାଇଁ ଲଗାଇବା ଦୂରତା ୧.୮×୧.୮ ମି. । ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩,୦୦୦ କଦଳୀ ପୁଆ ଲାଗେ । ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା, ବଡ଼ଳ, ଅମୃତପାଣି କିସମ ପାଇଁ ଲଗାଇବା ଦୂରତା ୨.୫ମି.×୨.୫ମି. । ଏଥିପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨,୦୦୦ କଦଳୀ ପୁଆ ଦରକାର ହୁଏ । ମୃତ୍ୟେକ ପୁଆର ଓଜନ ୪୦୦ରୁ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ : ଜମିକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଖରା ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ୍ । ତା'ପରେ ମାଟି ଟେଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରିବେ । ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କି.ଗ୍ରା. ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକଟର ଜୀବାଣୁ ସାରକୁ ଦୁଇ କିଣ୍ଟାଲ ଖତ ସହ ମିଶାଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଗାତ (୪୫×୪୫×୪୫) ସେ.ମି. ଖୋଳି ଗୋଟିଏ ମାସ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ ଓ ତା'ପରେ ଦୁଇ ଟୋକେଇ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ଦେବେ, ତା ସହିତ ୨୦ରୁ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫୁରାଡ଼ିନ, ୬୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ସୁପରଫସଫେଟ୍, ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ନିୟ ପିଡ଼ିଆ ବା କରଞ୍ଜି ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇବେ । ମାଟି ଭରିବାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ପରେ ପୁଆ (ବିଶୋଧୂତ) ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ ।

ପୁଆ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ :

୧. ୪୦୦-୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ଶିଳୀପୁଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ।

୨. ୩-୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ପୁଆ ଲଗାଇବେ । ପୁଆର ମୂଳଅଂଶକୁ କନ୍ଦା କହାନ୍ତି, ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ କନ୍ଦା ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନହୁଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

୩. ପୁଆ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ଚେରଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
୪. ପୁଆର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟି ସଫା କରିବେ ।
୫. ୩ ଗ୍ରାମ୍ ଡିଥେନ୍ - ଏମ୍-୪୫କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପୁଆର ମୂଳଭାଗକୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବେ, ତା'ପରେ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଗାତରେ ଲଗାଇବେ । ବାରିଷ୍ଟନ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପୁଆ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ ।
୬. ବିଶୋଧିତ ପୁଆକୁ ଗାତ (୪୫×୪୫×୪୫) ସେ.ମି ମଝିରେ ଲଗାଇ ଚାରି ପାଖରେ ମାଟିକୁ ଦାବି ଦେବେ । ପୁଆର କନ୍ୟା ଯେପରି ମାଟି ତଳେ ରୁହେ ଧାନ ଦେବେ ।
୭. ପୁଆକୁ ଏପରି ଲଗାଇବେ, ଯେମିତି ମୂଳ ଭୂଇଁଠାରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ତଳେ ରହିବ ।

ସାର ପ୍ରୟୋଗ :

ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ	ଗଛ ପିଛା ସାର
ମୂଳ ସାର	ଦୁଇ ଝୁଡ଼ି ସକ୍ୱା ଖତ, ୬୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ୨୫୦ ଗ୍ରା ନିମ୍ବ / କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ, ୨୦ ଗ୍ରା ପୁରାଡୁନ୍ ।
ଲଗାଇବାର ୨ ମାସରେ	୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ (୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସି.ଏ.ଏନ୍.) ଓ ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ।
ଲଗାଇବାର ୪ ମାସରେ	୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ (୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସି.ଏ.ଏନ୍.) ଓ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ।
ଲଗାଇବାର ୬ ମାସରେ	୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ (୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସି.ଏ.ଏନ୍.) ଓ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ।

ଅନ୍ତଃତାଷ : କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୫-୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜମିରେ ଥିବା ଖାଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅମଳକ୍ଷମ ପରିବା ଓ ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । ସପୁରୀ, ଅଦା, ହଳଦୀ, ମୂଳା, ଗାଜର, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଟି, ଜହ୍ନି, ବରଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡୁ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତଃଫସଲ ଭାବେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ । କଦଳୀକୁ ଅନ୍ତଃଫସଲ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସପେଟା, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ପିଚୁଲି ଓ ଲେମ୍ବୁ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ ।

ଜଳସେଚନ : ମାଟିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦା ଆକାରରେ ଓ ତା'ପରେ ନାଳାରେ ପାଣି ଦେଲେ ପାଣି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ । ଶୀତ ଦିନେ ମାସକୁ ୨-୩ ଥର ଓ ଖରା ଦିନେ ୪-୫ ଥର ପାଣି ଦେବା ଦରକାର । ଚମ୍ପା ଓ ପାଟକପୁରା କିସମ କଦଳୀରେ କମ୍ ଥର ଜଳସେଚନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ରୋବଷ୍ଟା ଓ କାବୁଲି କିସମ କଦଳୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଷାଦିନେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ରୋଗଯୋକ ନିରାକରଣ :

କଦଳୀ ଗଛରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କଲେ କଦଳୀର ଫସଲରେ ସେତେଟା ରୋକଯୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନାହିଁ । ତଥାପି କଦଳୀର ଅଣକଦଳୀଆ, ଝାଉଁଳା ଏବଂ ପତ୍ରଦାଗ (ସିଗାଟୋକା), କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଓ କନ୍ୟାକଟା ଯୋକ ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟତମ । ଯାହାର ନିରାକରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ।

କ୍ର.ସଂ.	ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୂର୍ଭାବ	ଲକ୍ଷଣ	ନିରାକରଣ
୧.	ଅଣ କଦଳୀଆ (Bunchy Top)	ଗଛ ଅଗରେ ଗୁଚ୍ଛହୋଇ ଛୋଟ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ପତ୍ର ତଳଭାଗରେ କଳାକଳା ଦାଗ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମତମତ ହୁଏ। ଏକ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜପୋକ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ।	ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ସଫା କରିବା ସହ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ପୋତିବା ଉଚିତ୍। ଗଛମୂଳକୁ ମଝି ସମ୍ଭାରେ କିରୋସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ମେଗାସିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଥବା ଭାଇମିଥୋଏର୍ ଔଷଧକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
୨.	ଝାଉଁଳା ରୋଗ (ସାନାମା/ପୁଜାରିୟମ୍)	ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହେବା ସହିତ ବାହୁଙ୍ଗା ମୂଳରୁ ଭାଙ୍ଗି ଓହଳି ରହିଥାଏ ଏପରିକି ଗଛମୂଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୃଥା ବାହାରିଥାଏ। ପତା ମାଛ ଗଛ ବାରିହୁଏ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ସହିତ ତୁଳନ ପରିମାଣ କମ୍ ଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ।	ଗଛମୂଳକୁ ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍। ଜମିକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରତି ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ କାର୍ବେଣ୍ଡିଜିମ୍ କିମ୍ବା ବିନୋମାଇଲ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି ୧-୫ ଗ୍ରାମ୍ ମାଟି ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍।

କ୍ର.ସଂ.	ରୋଗ ଯୋଗର ପ୍ରାଦୃଭାବ	ଲକ୍ଷଣ	ନିରାକରଣ
୩.	ମୋକ ଝାଉଁଳା ରୋଗ	ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଗଲାପରି ଦେଖାଯାଏ ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଅସମୟରେ ପଡ଼ିଯାଏ କାଷ୍ଠ ଓ କନ୍ଦାକୁ କାଟିଲେ କଟାଶଂରେ ଚିକ୍କଣ ଚକ୍ ଚକ୍ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ।	ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଓ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଗଛ ମୂଳକୁ ସ୍ତେପ୍ସୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ୧୦ ଲିଟର ପ୍ରତି ଏକ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା
୪.	ପତ୍ରହୀନ (ସିଗାଟୋକା)	ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ (ଦାଗ) ଦେଖାଦେଇ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ମାଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯୋଡ଼ି ମରିଯାଏ। ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ବିଶେଷ କରି ଆର୍ତୁ ଓ ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ। (ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଷି ନାମକ କବକ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ)	ଇଣ୍ଟେସିଭ ଏମ୍-୪୫ ବା କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା ଜିରାମ୍ (୦.୨%) କିମ୍ବା ମାନ୍‌କୋଜେମ୍ (୦.୨୫%) ଓ ଖଣିଜ ତୈଳ (୦.୧%) କିମ୍ବା ଆଇଓଫିନେଲ୍ ମିଥାଇଲ୍ (୦.୧୫%) ଓ ଲିନସିଡ୍, ଡେଲ (୨%) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨-୩ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ୧୫-୨୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ।

କ୍ର.ସଂ.	ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାକୃତାବ	ଲକ୍ଷଣ	ନିରାକରଣ
୫.	କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ	ଏହା କଦଳୀ ମୂଣ୍ଡରେ ବା କାଣ୍ଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ସତସତିଆ ଜମି ସହିତ ଗଛମୂଳ ଘାସ ଦ୍ଵାରା ଆଛାଦିତ ଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଉତ୍ପତ୍ତିଥାଏ।	ପୃଥାକୁ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବିଶୋଧନ କରି ଗଛମୂଳରେ ୫-୧୦ ଗ୍ରାମ ଅମେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
୬.	କନ୍ଦା କଟା ପୋକ	କଦଳୀ ଗଛର ଉପରୁ ତଳୁ ସିଧାକରି ନଳାମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡିଥାଏ ଓ ଏହାର ସ୍ଵାଭାବିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିନଥାଏ।	ଗଛ ମୂଳକୁ ମେଟାସିଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ଦ୍ରବଣ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ନଚେତ୍ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କିଗ୍ରା ଫୋରେକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ସୂଚନା : ୦.୧% = ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ / ୧ ମି.ଲି., ୦.୧୫% = ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ / ୧.୫ ମି.ଲି.
 ୦.୨% = ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ / ୨ ମି.ଲି., ୦.୫% = ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ଗ୍ରାମ / ୫ ମି.ଲି.
 ୦.୦୦୨୫% = ୪ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ / ୧ ମି.ଲି. ୨% = ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ / ୨୦ ମି.ଲି.

ହେଲ୍ପର ପ୍ରତି କଦଳୀ ଚାଷର ଆୟବ୍ୟୟ ଅବେଳ

କ୍ର.ସଂ.	ବିବରଣୀ	ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି		ମୂଳି ପଦ୍ଧତି	
		ମୋଟ ଶ୍ରମ ବିବସ	ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା)	ମୋଟ ଶ୍ରମ ବିବସ	ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା)
୧.	ହାଲୁର ହଳ (ଟ. ୫୦୦/ହାଲୁ)	୫ ହାଲୁ	୨,୫୦୦	-	-
୨.	ଜମିରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା	୮	୧,୦୦୮	-	-
୩.	ଗାଡ ଖୋଳିବା	୮୦	୧୦,୦୮୦	-	-
୪.	ଗାଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା	୨୭	୩,୪୦୭	-	-
୫.	ଗଛ ଲଗାଇବା, ପାଣିଦେବା	୨୫	୩,୧୫୦	-	-
୬.	ଜଳସେଚନ	୧୦୦	୧୨,୨୦୦	୨୫	୯,୪୫୦
୭.	ଅନ୍ୟାନ୍ୟକର୍ମ, ସାଗଦେବା	୧୧୫	୧୪,୪୮୦	୧୫୦	୧୮,୯୦୦
୮.	ପୁଆ ନଷ୍ଟ କରିବା	୪୦	୨,୦୪୦	୫୦	୨,୫୦୦
୯.	ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା	୪୦	୫,୦୪୦	୩୫	୪,୪୧୦
୧୦.	ବାଡ଼ କରିବା	୭୫	୯,୪୫୦	୧୦	୧,୨୨୦
୧୧.	ଅମଳ	୩୦	୩,୭୮୦	୩୦	୩,୭୮୦
(ଖ) ଉପାଦାନକୁ ଉପାଦାନ		୫୪୦	୭୦,୫୪୦	୩୫୦	୪୪,୧୦୦
୧.	ପୁଆ/ ଚାଷ, ୭.୮୦ ଟଙ୍କା	୨,୫୦୦	୧୯,୫୦୦	-	-
୨.	ପୁଆ ବିଶୋଧନ(ବେଳା ୧ଦେଇ)	-	୮୦୦	-	-


ନା.	ଖଡ ଟ.୮୦୦/ମେଟ୍ରିକଟନ	ମାଠ	୨୪,୦୦୦	୧୦ ମେଟ୍ରିକଟନ	୮,୦୦୦
୪.	କୈବିକସାର ଟ.୮୦/କି.ଗ୍ରା.	୧୦ କି.ଗ୍ରା.	୮୦୦	-	-
୫.	ସାର ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ	୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୨,୧୮୫	୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୨,୧୮୫
	ଫସ୍‌ଫରସ୍	୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୪,୭୮୦	୫୦ ଗ୍ରାମ୍	୨,୩୯୦
	ସୋଡାସ	୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୧୩,୫୦୦	୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍	୧୩,୫୦୦
୬.	ଅଣୁସାର		୧,୫୦୦	-	୧,୨୦୦
୭.	ଜୀବନାଶକ ଔଷଧ		୨,୦୦୦	-	୨,୦୦୦
୮.	ଜଳସେଚନ		୨,୦୦୦	-	୨,୦୦୦
୯.	ପ୍ରୋପିଲ୍ ଟ.୧୦/ଗଜ		୨୫,୦୦୦	-	୫,୦୦୦
୧୦.	ଆହାଦାନ		୨୧,୦୦୦	-	-
୧୧.	ବାଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ		୨୦,୦୦୦	-	୫,୦୦୦
	ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ		୧,୪୯,୦୨୫	-	୫୩,୨୭୫
	ଆନୁସୂଚିକ ଖର୍ଚ୍ଚ		୨୧,୮୯୫	-	୯,୭୨୫
	ସର୍ବମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ		୨,୪୧,୫୦୦	-	୧,୦୭,୧୦୦
	ଅମଳ (୨୨୫୦ କାନ୍ଥ) (ଟ.୨୪୦କାନ୍ଥ ପ୍ରତି)		୫,୪୦,୦୦୦	-	୫,୪୦,୦୦୦
	ଲାଭ		୨,୯୮,୫୦୦		୪,୩୨,୯୦୦

ପେଷି ପୋଷଣ କଦଳୀ ଚାଷରେ କେବଳ ପୂଆଁ କିଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ କଦଳୀ ଚାଷର ଆୟକ୍ଷୟ ହିସାବ ପୂଆଁ କଦଳୀ ଚାଷ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ।

ଅମଳ : ବାଙ୍ଗରା/ବାମନ କିସମ (ରୋବଷା, ଡ୍ଵାର୍ପ କାଉଣ୍ଡିସ୍, କାବୁଲି) ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଏହା ୯-୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଧି ଓ ତେଜା କିସମ (ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା) ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ବତଳ, ବତିଶା (ପରିବା ଜାତୀୟ) କଦଳୀ ୧୨-୧୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଧି/ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ପେଶାପୋଷଣକୃତ କଦଳୀ ଗଛ ୬ ମାସରେ ଫୁଲ ଧରେ ଓ ପର ତିନି ମାସ ପରେ ଫଳ ପାକଳ ହୁଏ। କାନ୍ଧି ବାହାରିବା ଗଛର ବୟସ, ରୋପଣ, ପୋଷଣ ତଥା ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଫସଲ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅମଳର ୭-୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଧିରେ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଫଳ ସିଝିଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ପାଚେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଦଳୀ କାନ୍ଧିକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ଫଳ ବାର ପାଣିଆ ପାତି ଗଲାପରେ ଗଛରେ କାଟିନେଇ ପତାଇବା ଦରକାର। ପାତିଲା କଦଳୀ କାଟିବାର ୬ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକା ଥରକେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ଦିନ କଦଳୀ ବଗିଚା ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ନହେଲେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପରିବା ଜାତୀୟ କଦଳୀ ହେକୂର ପିଛା ୩୫-୪୦ ଟନ୍ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ଜାତୀୟ କଦଳୀ କିସମ (ଚମ୍ପା, ପାଟକପୁରା ଇତ୍ୟାଦି) ହେକୂର ପିଛା ୨୫-୩୦ ଟନ୍ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ।

କଦଳୀ ଚାଷରେ କେତେକ ସାବଧାନତା

- ମାଆ ଗଛର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ପୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛରୁ କାଟି ଅଲଗା କରିଦେବା ଭଲ, ନହେଲେ ଅମଳ କମିଯିବ। ୨-୩ ମାସରେ ଥରେ କୋଡ଼ାଖୁସା ଦରକାର।
- ମାଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶୀତଦିନେ ମାସକୁ ୨-୩ଥର ଓ ଖରାଦିନେ ୪-୫ଥର ପାଣି ଦେବେ ଯେପରି କୌଣସି ସମୟରେ କିଆରିରେ ଠିଆ ପାଣି ନ ରହେ କିମ୍ବା ପାଣି ଅଭାବରେ ଗଛ ନ ଝାଉଁଲେ।
- ମାଆ ଗଛରୁ ୪୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଛୁରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ପୁଆଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବା ଉଚିତ୍।
- ଅନାବଶ୍ୟକ ପୁଆଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପରେ ପୁଆର ମଝିରେ ଗାତ କରି ସେଥିରେ କିରୋସିନ ୩-୪ ମିଲି (୧ ଚାମଚ) ଜାଲି ଦେବେ; ଏହା ଦ୍ଵାରା କଟା ଯାଇଥିବା ପୁଆଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ।
- ଗଛ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ପତ୍ର (ହଳଦିଆ ହୋଇ ଶୁଖିଗଲେ)ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ସଫା କରିଦେବେ। ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ କଦଳୀ ଗଛରେ ୧୦-୧୨ଟି ପତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ୍।
- ମାଆ ଗଛରେ କାନ୍ଧି ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପୁଆ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।
- ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାରି ଆସେ, ତାକୁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ଵାରା ଜାଲି ଦେବେ।
- ଖରାଦିନେ ମାଟିରେ ଜଳାୟତ୍ନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଖୁଛେଦା, ନଡ଼ା, ପାଳ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିମ୍ବା କରଞ୍ଜି ପତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ଆଛାଦିତ କରି ରଖିବେ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନାବନା ଘାସ ଉଠିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ।
- ପୁଆ ଲଗାଇବାର ତାରି ମାସ ପରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ବାଉଁଶିନକୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ (୧ଥର ୧ ମାସ ଅନ୍ତରରେ) ରୋଗ ହୁଏନାହିଁ। ସେହିପରି ମେଟାସିଷ୍ଟକସ୍ ୨୦ ମି.ଲି. ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କଲେ ଅଣକଦଳୀଆ ରୋଗ ହେବନାହିଁ।
- କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଶେଷ କଦଳୀ ଫେଣାଠାରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ଛାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଦଳୀର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ।
- ଗଛକୁ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ କାଠ ବାଉଁଶର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ।



ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ : ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ (ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ)

ଯୋଗାଯୋଗ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି - ୭୬୧୦୧୭

Email : kvkgajapati.ouat@gmail.com