

ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମକା ଫସଲରେ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓ ମାଈ ଲେଉଟ ଯୋକର ପରିଚାଳନା



ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୦୩



ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମକା ଫସଲରେ
ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ ଓ ଫର୍ମ ରୋଗ ପୋକର ପରିଚାଳନା

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି
ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ସମ୍ପାଦକ

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ



ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମକା ଫସଲରେ
ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ସ ଓ ଫର୍ମ ରୋଗ ଯୋକର ପରିଚାଳନା

ବିଷୟବସ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ ସଂଜୀବ କୁମାର ମାଣ୍ଡି
ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ)

ସୁଶ୍ରୀ ମମତା ମାହାଲି
ଫାର୍ମ ମ୍ୟାନେଜର

ସମ୍ପାଦକ

ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

ପ୍ରକାଶକ :

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗଜପତି

ପ୍ରକାଶ କାଳ : ୨୦୧୯-୨୦୨୦

ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମକା ଫସଲରେ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱର୍ମ ରୋଗ ଯୋକର ପରିଚାଳନା

ଆମର ଏହି ବିରଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଖାପାଖି ୭୦୦ କୋଟି ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଜୀବତ ପ୍ରାଣୀ ବ□ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ, ବହୁ ଲୋକ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଦିଗରେ ଦିନରାତି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବେଳେ ଶସ୍ୟରେ ରୋଗ ଯୋକ ଦମନ କରିବା ସମୟ ସମୟରେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଏ । ଏପରିକି ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ରୋଗ ଯୋକର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ । ଏହି ପରି ଏକ ପ୍ରଜାତିର କୀଟ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କୀଟର ନାମ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱର୍ମ ରଖାଯାଇଛି । ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଏହି କୀଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱର୍ମ (*Spodoptera frugiperda*) ଏକ ସର୍ବ ଭକ୍ଷୀ କୀଟ ଅଟେ । ଏହା ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରଜାତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫସଲ ମାନଙ୍କରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଫସଲ ହାନି ଘଟାଇଥାଏ । ଆମ ଦେଶର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାଟ, ଛତିଶଗଡ ଏବଂ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କୀଟ ଗୋଟିଏ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ୩୦୦ କି.ମି. ଯାଏ ଉଡିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ । ସବୁ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏହି କୀଟ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମକା ଫସଲ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ମକା ଫସଲ ନ ଥିଲେ ଏହି କୀଟ ଜହ୍ନା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ନଚେତ୍ ଆଖୁ, ଧାନ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, କପା ଭଳି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ତେବେ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ଯୋକ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି କୀଟକୁ ଦମନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର :

୧. ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ କ'ଣ ?

ଉ : ପାଖାପାଖି ୮୦ କିସମରୁ ଅଧିକ ଫସଲର ରୋଗଯୋକ କୀଟ ହେଉଛି ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ । ଏହି କୀଟ ମକା, ଧାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯମ୍ବୁପରିବା ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଅମଳ ମଧୁ ହ୍ରାସ କରେଇଥାନ୍ତି । ଏହି କୀଟର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା (Larval Stage) ଅଧିକ କ୍ଷତି କରାଇଥାନ୍ତି । ଏହି କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କି.ମି. ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ।

୨. ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାନ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ?

ଉ : ଏହି ଦୁଇଟି କୀଟ ପାଖାପାଖି ସମାନ । କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଟିକିଏ ଫରକ ରହିଛି । ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ଆର୍ମି ଭଳି ଏକାଠି ହୋଇ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଫ୍ରିକାନ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଏକାଠି ହୋଇ ଗତି କରି ନ ଥାନ୍ତି ।

୩. ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମକା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ କି ?

ଉ : ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ମକା ଫସଲର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଯଦିଓ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମ ଦ୍ଵାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ମକା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ତଥାପି ବହୁ ଫସଲ ଏହି କୀଟ ଯୋଗୁଁ ଆଲଫାଟୋକ୍ସିନ୍ (Alfatoxin) ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଶରୀର ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ଅଟେ ।

୪. ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ଅଟେ କି ?

ଉ : ଫଲ୍ ଆର୍ମି ଓର୍ମର ମାଛ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ ବିଚକ୍ଷଣ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଯାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଏପରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଉଇର ଅନୁପମ୍ପିଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

୫. ଏହି କୀଟ ଦମନ ପାଇଁ କ'ଣ ଯାଇ ପାରିବ ?

ଉ : ବହୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଆମେରିକା ଦ୍ଵାରା ଏହି କୀଟ ଦମନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଫ୍ରିକାନ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କୀଟକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ ।

୬. ଚାଷୀମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫସଲ ଲଗାଇପାରିବେ ?

ଉ : ଆଫ୍ରିକାରେ ମକା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ରୂପେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହା ବଦଳରେ

ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫସଲ ଆପଣେଇବା କଷ୍ଟକର । ତେବେ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କାଟ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ ।

୭. ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ ଭାରତରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ କି ?

ଉ : ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବସ୍ତୁ ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମର ମାଛ କାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ମକା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସଂଭବ ନୁହେଁ ।

୮. ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ ଦମନ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ କିପରି ?

ଉ : ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କାଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି କାଟ ନାଶକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାପମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମର ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ:-

ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ନିମ୍ନୋକ୍ତରେ ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମର ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ତାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀକାନଙ୍କୁ ଏହି କାଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇ ପାରିବ ।

୧- ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମର ଅଣ୍ଡା:-

ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମରୁ ହାଲକା ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେକାଠି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ । ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ୨-୩ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି ।

୨- ସଲଭ (Larvae):-

୩- ସଲଭ (ପ୍ରଥମ ରୁ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା):-

ସମୁଦାୟ ଏହି କାଟର ୬ଟି ସଲଭ ଅବସ୍ଥା ଅଛି । ପ୍ରଥମ ରୁ ଏହି ସଲଭ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଧିରେ ଧିରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଏହା ଗାଢ଼ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାନ୍ତି ।



(୧)

(୨)

(୩)

୪- ଫଲ ଆର୍ମି ଝୁର୍ମର ଷଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା:-

ଏହି ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଏହି କୀଟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିହୁଏ । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଓଲଟା “Y” ଭଳି ଧଳା ଦାଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ଏକ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ୪ ଗୋଟି ଧଳା ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ ।

୫- ପ୍ୟୁପା ଅବସ୍ଥା:

ପ୍ୟୁପା ଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ବାଦାମି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ଭିତରେ ଖୋସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି ।

୬- କୀଟ ଅବସ୍ଥା:

ଏହି କୀଟ ୩-୪ ସେମି ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ସାମନା ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ବାଦାମି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପଛ ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ୨-୩ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହି ପାରନ୍ତି ।

ଫଲ ଆର୍ମି ଝୁର୍ମର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଏବଂ ମକା ଗଛରେ କରାଉଥିବା କ୍ଷତି:-



(୪)



(୫)




(୬)

ନିମ୍ନର ଚିତ୍ରଟିରେ ଫଲ ଆର୍ମି ଝୁର୍ମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଏବଂ ମକା ଗଛରେ କେଉଁ ଅଂଶକୁ କ୍ଷତି କରାଇଥାନ୍ତି ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

● ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ରର ପଛପଟେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାତି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ପତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ରୁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା:

ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରର ତଳ ପଟୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ଛୋଟ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ କୀଟ ମାନେ ପତ୍ରସନ୍ଧିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ମକା ଚାରିପଟେ ଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି କୀଟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତ୍ରିରେ ଗଛ ମାନଙ୍କରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ।



ଚତୁର୍ଥ ରୁ ଷଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା:-

ଫଲ ଆର୍ମି ଥର୍ମର ତୃତୀୟ ରୁ ଷଷ୍ଠ ସଲଭ ଅବସ୍ଥା ଟି ମକା ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ (Whorl) ପଶି ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି । କଅଁଳିଆ ଗଛରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଫଳରେ ଗଛରେ ଆଉ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳି ପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମକା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ପାରେ ନାହିଁ । ପ୍ରତେକ ସନ୍ଧାରେ ୧ ରୁ ୨ଟି କୀଟ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି କୀଟ ମାନଙ୍କର ମଳ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଯାହା । ଶୁଖିଲା ପରେ କରତ ଗୁଣ୍ଠ ପରି ଦେଖାଯାଏ ।

● ମାଛ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲେ ୧୦୦-୩୦୦ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୫୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ମକା ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ଫଲ ଆର୍ମି ଥର୍ମର କୀଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ଏହି କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି । କଅଁଳିଆ ମକା ପତ୍ର ଏହି କୀଟ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ୮-୧୪ ଦିନିଆ ପୂରଣା ସଲଭ ଗୁଡ଼ିକ ମକା ଗଛର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରାଇଥାନ୍ତି । ଏହି କୀଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନେ ଗଛର ଟେସେଲ (tassel) ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଅମଳ କମିଯାଏ ।

ଫଲ ଆର୍ମି ଥର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୋଗଯୋକ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍

ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଯୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫଲ ଆର୍ମି ଥର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୀଟ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା । ଏବଂ ଗଛକୁ କ୍ଷତି କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ।

ନିମ୍ନରେ ମକା ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା କାଷ୍ଠ ବିନ୍ଧା ଯୋକ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଦର୍ଶା ଯାଇଅଛି ।
Busseoca fusca, *Chico Partecus* ଏବଂ *Sesmania Calamistis*
ଏଗୁଡ଼ିକ ମକା ଗଛର କିଛି କାଷ୍ଠ ବିନ୍ଧା ଯୋକର ନାମ ଅଟେ ।

କାଷ୍ଠ ବିନ୍ଧା ଯୋକ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ଫଲ ଆର୍ମି ଥର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ମକା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ:-

୧- ଫଲ ଆର୍ମି ଥର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ମକା ଗଛରେ ବଡ଼ ଛିଦ୍ର (hole) ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଯାହା କି କାଷ୍ଠ ବିନ୍ଧା ଯୋକ ସଂକ୍ରମଣରେ ମକା ଗଛରେ ହୁଏ ନାହିଁ ।

୨- କାଷ୍ଠ ବିନ୍ଧା ଯୋକର ସଲଭ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ନଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଫଲ ଆର୍ମି ଥର୍ମର ସଲଭ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ରହିଥାନ୍ତି ।

ମକା ଗଛରେ ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ସ ଥିର୍ମ ଫୋକ ପରିଚାଳନା :

ମନିଟରିଙ୍ଗ୍ (Monitoring)

ମକା ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ଏକର ପ୍ରତି ୦.୫ଟି ଫେରୋମୋନ ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାଇବା ଦରକାର ।

ସ୍କାଉଟିଙ୍ଗ୍ (Scouting)

ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା ହେବା କ୍ଷଣି ମକା ଫସଲରେ ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ସ ଥିର୍ମ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଚାରା ହବାର ୩-୪ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ୫ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଚାରା ହେବାର ୫-୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ନୂତନ ପତ୍ର ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଟାସେଲିଙ୍ଗ୍ (tasseling) ଅବସ୍ଥାରେ କୀଟ ନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ତେବେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ।

ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ସ ଥିର୍ମ ଫୋକ ପରିଚାଳନା :-

୧) ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ହଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ସ ଥିର୍ମର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଫୋକ, ପକ୍ଷୀ ଆଖିରେ ଆସି ଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ।

୨) ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

୩) ମକା ସହ ଅନ୍ୟ ତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଅନ୍ଧା ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ଫୋକର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରେ ।

୪) ଚଢ଼େଇ ବସିବା ପାଇଁ ଡ଼ାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଏକରରେ ୧୦ଟି ଲଗାଇ ପାରିବା । (୩୦ ଦିନ ଯାଏ)

୫) ୩-୪ ଧାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘାସ ଜାତୀୟ ଯଥା ନାପିଅର (Napier) ମକା କ୍ଷେତରେ ଚାରି ପଟେ ଲଗାଇ ପାରିବା ।

୬) ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରିବା ।

୭) ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମକା ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ବାଲି ଓ ତୁନ (୨:୧) ଅନୁପାତରେ ମିଶାଇ ପକାଇ ପାରିବା ।

ମକାନିକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (Mechanical Control)

୧) ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ସ ଥିର୍ମର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଦଳି ମାରି ପାରିବା କିମ୍ବା କିରୋସିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ମାରି ପାରିବା ।

୨) ଫଲ୍ ଆର୍ମ୍ସ ଥିର୍ମ ଫୋକ ଦେଖାଦେଲେ ମାତ୍ରେକେ ମକା ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ଗୁଣ୍ଡୁଳା ବାଲି ଦେଇ ଫୋକ ମାରି ପାରିବା ।



ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ : ଡଃ ସଂଗ୍ରାମ ପରମଗୁରୁ (ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ)

ଯୋଗାଯୋଗ : କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ରା. ଉଦୟଗିରି, ଗଜପତି - ୭୬୧୦୧୭

Email : kvkgajapati.ouat@gmail.com